

崇仁醫護管理專科學校 105 級護理師執照考

考前衝刺班<第 1 次模擬競試>

科目：內外科護理學（共 4 頁） 班級： 姓名： 學號：

一、選擇題：每題 1.25 分，總分 100%

- A 1. 25 歲女性，上午發生上腹部疼痛，下午轉為右下腹痛，理學檢查時右下腹壓痛及反彈痛都很明顯，抽血檢查白血球  $15800/\text{mm}^3$ 。你認為最有可能發生：  
(A)急性闌尾炎 (B)急性憩室炎 (C)骨盆腔炎 (D)腎盂腎炎
- A 2. 有關完全腸胃道外營養(TPN)之敘述，何者錯誤？(A)TPN 突然停止輸液，需密切監測血糖變化，以防反彈性高血糖反應 (B)出現單側頸靜脈膨脹或手臂水腫時，需懷疑有靜脈血栓的可能 (C)因 TPN 屬於高張溶液，輸注時應選擇大靜脈注入 (D)TPN 管路嚴禁使用任何藥
- B 3. 追蹤結腸癌病人在手術後是否有復發，應檢測何種腫瘤標幟？(A)AFP(alfa fetal protein) (B)CEA(carcinoembryonic antigen) (C)PSA(prostatic acid phosphatase) (D)CA-125。
- D 4. 目前有哪些方法可偵測幽門螺旋桿菌感染，何者除外？  
(A)內視鏡切片病理檢查 (B) $^{13}\text{C}$  urea 呼氣檢查 (C)血清學檢查 (D)尿液檢驗
- B 5. 有關胃潰瘍的徵象，何者正確？①右上腹疼痛②常見噁心嘔吐③進食後 30 分鐘~1 小時會發生疼痛④半夜、空腹時會發生疼痛(A)①② (B)②③ (C)②④ (D)③④
- C 6. 有關膽結石之評估與處置，下列何者最正確？(A)膽道內結石比膽囊內結石常見(B)左上象限脹痛，會反射至左肩膀或肩胛處(C)尿液顏色變深茶色、皮膚搔癢(D)使用 morphine 以減輕膽道痙攣痛
- A 7. 林先生因肝硬化(liver cirrhosis)合併腹水(ascites)住院治療，抽血檢驗  $\text{K}^+$ ：3.0 mEq/L，宜服用下列何種藥物？(A)Aldactone (B)Aldosterone (C)Lasix (D)Losec
- D 8. 林先生接受膽囊切除術(cholecystectomy)，手術治療後放置 T 型管引流，下列護理措施何者錯誤？  
(A)採低坐臥位(床頭抬高 30-45 度)，保持引流系統低於膽囊位置(B)監測 T 型管引流液的顏色、量、味道，顏色會由紅色→咖啡色→墨綠色(C)監測是否再度發生膽管阻塞的症狀，如黃疸、灰色便等 (D)下床時要將引流管夾住，避免引流液逆流
- C 9. 陳小姐有出血性胰臟炎，在她的肚臍周圍現有淡藍色的變化，請問這是屬於下列那一種徵象？  
(A)狄特克氏徵象(Chvostek's sign) (B)特納氏徵象(Turner's sign) (C)寇倫氏徵象(Cullen's sign) (D)克尼格氏徵象(Kernig's sign)
- C 10. 下列何者不是急性呼吸窘迫症候群(Acute respiratory distress syndrome, ARDS)之主要臨床表徵？(A)肺動脈楔壓  $< 18 \text{ mmHg}$  (B)胸部 X 光片兩側肺瀰漫性浸潤 (C)功能性肺餘容量(FRC)增加(D)治療無效性的血氧過低
- A 11. 肺水腫病人使用 furosemide(Lasix)和 morphine 是為了以下列何種治療目的？  
(A)減少前負荷和心肌耗氧量 (B)減少後負荷和心肌耗氧量 (C)增加前負荷和改善心臟收縮力 (D)改善心臟收縮力同時增加後負荷
- B 12. 以下列何者不是張力性氣胸的臨床表徵？  
(A)嚴重呼吸短促 (B)氣管偏移向患側 (C)患側肺部扣診為反響音 (D)患側呼吸音消失
- C 13. 以鼻導管(nasal cannula)給氧，若  $\text{FiO}_2$  想要達到 32%，氧流量( $\text{O}_2$  flow meter)需開多少？  
(A)1 liter/min (B)2 liter/min (C)3 liter/min (D)4 liter/min
- C 14. 連枷胸病人的呼吸模式為：(A)凹陷式呼吸(B)不規則呼吸(C)奇異呼吸(D)狹窄式呼吸
- D 15. 有關以胸腔引流排除肋膜腔積聚之液體的敘述，下列何者正確？  
(A)胸管尖端由第二肋間插入 (B)水下引流管內之液面在吸氣時會下降 (C)每小時引流液超出 50 c.c.時，要立即報告醫師 (D)拔管時，請病患深吸氣後摒住呼吸。
- A 16. 以下四種抗結核第一線藥物中，何者最容易引起高尿酸血症？  
(A)pyrazinamide (B)rifampin (C)ethambutol (D)isoniazid
- B 17. 運用身評技巧，執行病人胸部評估時，下列評估結果正確？①呼吸道狹窄的病人於聽診時，會聽到喘鳴聲②肺氣腫病人於視診時，可看到病人之胸部前後徑加大③大葉性肺炎病人於觸診時，觸覺震顫會增強④肋膜積水病人於叩診時，會出現過度的反響音(A)①②④(B)①②③(C)②③④ (D)①③④
- C 18. 急性期紅斑性狼瘡(SLE)的病人，其血中補體(C3、C4)濃度會有何改變？  
(A)不變 (B)上升 (C)減少 (D)不一定
- C 19. 下列何者屬於細胞溶解性過敏反應？

- (A)過敏性休克 (B)接觸性皮膚炎 (C)ABO 血型不合 (D)全身性紅斑性狼瘡
- B 20. 下列何者是愛滋病免疫功能缺乏的特徵？(A)T 淋巴球數目增加 (B)單核白血球功能缺乏 (C)自然殺手細胞數目減少 (D)輔助性 T<sub>4</sub> 細胞/抑制性 T<sub>8</sub> 細胞比值增加。
- A 21. 類風溼性關節炎患者，在血液及免疫學檢查的檢驗結果中，較常呈現下列何種異常情況？(A)抗核抗體(ANA)呈陽性反應 (B)紅血球沉降速率(ESR)下降 (C)全鐵結合能力(TIBC)升高 (D)C 反應蛋白質下降。
- B 22. 心外按摩(external cardiac compression)是藉由外力按壓胸部，增加胸內壓，強迫心臟收縮而將血液射出，以維持循環，其心搏量僅有正常的？(A)15 ~ 25% (B)25 ~ 33% (C)33 ~ 50% (D)5 ~ 13%
- C 23. 下列何者是低血容積性休克病人達到有效輸液治療之最佳表徵？(A)脈搏每分鐘 60 到 100 次 (B)收縮壓大於 110mmHg 且舒張壓大於 90mmHg (C)尿量每小時每公斤大於 0.5c.c. (D)呼吸速率每分鐘在 12~20 次之間
- D 24. 下列有關成人心肺復甦醒術之敘述，下列何者為非？(A)心外按摩時施救者手指不可放在患者肋骨上 (B)施救者雙腿分開與肩同寬，肘關節勿彎，肩膀在個案胸骨正上方 (C)作完五個週期的人工呼吸及心外按摩後，需評估頸動脈及呼吸是否恢復 (D)評估頸動脈時間需大於 10 秒
- B 25. 有關骨質疏鬆症的敘述，下列選項何者正確？①女性發生率比男性高 ②可做荷爾蒙補充療法 ③鼓勵多攝取鐵質 ④預防跌倒，應長期在家臥床 ⑤骨質疏鬆症臨床表徵為背痛 ⑥甲狀腺機能低下會造成骨質疏鬆症 (A)②④⑤ (B)①②⑤ (C)①③⑥ (D)③④⑥
- A 26. 有關接受全髖關節置換術後的病人敘述，下列何者顯示需要進一步的護理指導？(A)「術後側臥時，患側髖關節應保持內收的姿勢」 (B)「我六個星期內不能開車」 (C)避免過多的重量放在患肢 (D)避免坐軟而深的沙發椅或低矮椅子
- C 27. 有關腔隙症候群 (compartment syndrome) 之敘述，下列何者正確？(A)最早出現的症狀是發熱 (B)骨切開術可緩解症狀 (C)處理方法是去除壓迫的來源 (D)6P 中包含小瘀點(Petechiae)
- D 28. 有關下肢石膏拆除後的護理措施，下列何者正確？(A)用酒精浸泡去除痂屑 (B)臥床休息不可離床，以堅定骨質 (C)提供彈性繃帶，並由近心端往遠心端纏繞 (D)坐時抬高患肢，以減輕腫脹
- D 29. 有關 rheumatoid arthritis 之敘述，下列何者錯誤？(A)患者抽血可能出現 RF 因子 (B)雙手關節炎嚴重時會出現尺側偏斜及天鵝頸 (C)可能出現乾燥症候群、Felty's 症候群的合併症 (D)清晨關節疼痛，於活動後可緩解
- A 30. 有關扁桃腺切除術及術後護理的敘述，下列何者正確？(A)手術適應症為扁桃腺炎一年發作超過四次，每次超過七天 (B)指導病人冰敷兩側上頸部 72 小時，以減輕疼痛及止血 (C)用力咳嗽以促進分泌物排出 (D)術後即可進食冰冷流質食物
- D 31. 有關鼻竇炎之敘述，何者正確？(A)患者常出現鼻塞、咳嗽，少有發燒 (B)慢性鼻竇炎症狀於睡前最為嚴重 (C)選擇寒冷、乾燥的環境居住，預防疾病復發 (D)術後應教導病人吐出積在鼻咽部之引流物。
- A 32. 有關急性中耳炎醫療處置及術後護理措施的敘述，下列何者錯誤？(A)抗生素的使用要持續 3~5 天 (B)局部熱敷，擴張血管，促進體液吸收，降低腫脹情形 (C)術後幾週應避免彎腰、提重物及擤鼻涕 (D)術後避免搭飛機、玩自由落體及潛水。
- D 33. 有關調製 Chemotherapy 藥物的注意事項，下列何者錯誤？(A)穿著隔離衣、戴口罩、護目鏡及手套 (B)抽取藥物勿讓藥液量達到針筒的 3/4 以上 (C)最好使用垂直型層流操作櫃(vertical laminar air flow hood)(D)抽取 vial 藥物時，需維持瓶內正壓
- C 34. 癌症病患疼痛控制的原則何者為是？(A)必要時可使用安慰劑來解除病人的疼痛 (B)止痛藥以注射方式為主 (C)嗎啡類藥物使用之初，可能會出現頭暈、嗜睡、噁心等症狀 (D)需要時給予止痛藥
- C 35. 當癌症病患的放射線植入物脫出時，正確處理的方式為何？(A)以防淤紙墊覆蓋，再徒手拾起 (B)戴無菌手套拾起 (C)以長柄鑷子夾起置入鉛盒中 (D)通知放射線部門人員前來處理
- D 36. 減少暴露於放射線輻射需掌握的要素，包括下列那些項目？(1)時間(2)距離 (3)藥物劑量 (4)屏障物 (A) (1)+(2) (B) (1)+(3) (C) (1)+(2)+(3) (D) (1)+(2)+(4)
- B 37. 癌症病患接受 Chemotherapy，出現骨髓抑制的副作用，下列護理措施，何者錯誤？(A)教導使用軟毛牙刷，以免牙齦出血 (B)告知絕對臥床，以防自發性出血 (C)給予軟便藥物，以免便秘 (D)教導避免使用 aspirin 或灌腸，以免出血
- D 38. 化學藥劑潑灑時的處理，何者為非？(A)潑灑區要限制他人入內 (B)化學藥劑如為藥粉應以略帶濕的吸水紗布擦拭 (C)處理人員應穿上隔離衣、戴手套、口罩、護目鏡等 (D)藥物噴灑到眼睛，立刻就醫
- C 39. 有關病患服用 Digoxin 藥物之敘述，何者正確？(A)血中 Digoxin 有效治療濃度為 1.8~2ng/ml (B)血中 Digoxin 中毒濃度為 >4.2ng/ml (C)高血鈣者易發生毛地黃中毒 (D)紅色視覺是毛地黃中毒之症狀
- A 40. 護理人員評估病患發現其呼吸音正常，但在心尖處舒張期聽到雜音，病患最可能有下列何種健康

- 問題？(A)僧帽瓣狹窄 (B)三尖瓣狹窄(C)僧帽瓣逆流 (D)三尖瓣逆流。
- B 41. 有關冠狀動脈繞道手術(CABG)的敘述，下列何者錯誤？(A)將病人上下腔靜脈或股靜脈的不飽和含氧血，經由心肺機進行氣體交換再進入體循環中 (B)術中病人體溫維持在 18~22°C 之間 (C)術中病人使用的靜脈輸液需添加肝素，以稀釋血液及預防血栓形成 (D)術後，須再注射 protamine sulfate，以中和肝素。
- B 42. 有關經食道心臟攝影超音波檢查(TEE)之敘述，下列何者錯誤？  
(A)檢查前，必須禁食 6~8 小時 (B)檢查前，需給 Gascon 5mL 消除胃內氣體  
(C)檢查後，需等待嘔吐反射恢復才可進食(D)此檢查可判定心臟結構和功能。
- A 43. 心房纖維性顫動(atrial fibrillation)之敘述，下列何者正確？(A)聽診心尖脈節律為不規則 (B)心尖脈與週邊脈搏次數相同 (C)心電圖常有單一明顯的 P 波 (D)為立即性致命的心律不整。
- A 44. 病人抽血檢查結果:triglyceride 190mg/dL; cholesterol 150mg/dL;HDL 45mg/dL; LDL 100mg/dL，表示有何種情況？(A)三酸甘油酯過高(B)膽固醇過低(C)高密度脂蛋白過低 (D)低密度脂蛋白過高。
- B 45. 有關心內膜炎之敘述，下列何者正確？(A)大部分的心內膜炎是由自體免疫反應所致 (B)使用人工植入物如人工血管、人工節律器等，是引發心內膜炎的原因之一 (C)心內膜炎依據症狀嚴重程度分為急性與亞急性心內膜炎 (D)瓣膜異常是造成心內膜炎發生的原因之一。
- C 46. 有關動脈硬化阻塞疾病(arteriosclerosis obliterans)的敘述，下列何者錯誤？(A)病人會出現間歇性跛行、肢體蒼白、週邊觸診不到脈動 (B)晚期病人休息時肢體末端會有持續性、隱隱不適的疼痛 (C)手壓測定法(manual compression test)檢查時會發現病人微血管充盈緩慢 (D)指導病人勿穿過緊衣物以免影響循環。
- B 47. 有關治療高血壓藥物血管升壓素轉換酶抑制劑(ACEI)的主要作用，下列何者正確？  
(A)抑制腎素轉換為血管收縮素 I (B)抑制血管收縮素 I 轉換為血管收縮素 II  
(C)抑制血管收縮素 II 轉換為血管收縮素 III (D)抑制血管收縮素 III 轉換為腎素。
- C 48. 有關血栓性靜脈炎之護理原則，下列敘述何者錯誤？  
(A)病人足背屈曲時，腓腸肌會產生疼痛 (B)口服 Coumadin 可預防及治療靜脈血栓  
(C)應定期按摩病人患肢，以促進靜脈循環 (D)協助病人抬高患肢，可減輕炎症及疼痛。
- D 49. 有關巨人症之敘述，下列何者錯誤？(A)生長素分泌過多造成 (B)發生在青春期前 (C)末期會因促性腺激素不足，而使第二性徵發育延遲 (D)有低血糖的症狀。
- A 50. 有關糖尿病病人出現酮酸中毒(DKA)之常見治療方式，下列何者錯誤？  
(A)若清醒要趕緊提供糖果，若昏迷就靜脈推注 50%葡萄糖 (B)尿液排出量充足時需補充鉀離子  
(C)增加胰島素劑量 (D)血液 pH 值低於 7.0 時，則予以重碳酸鈉(NaHCO<sub>3</sub>)。
- D 51. 有關高血糖高滲透壓狀態(HHS)之敘述，下列何者錯誤？  
(A)主要發生於第 2 型糖尿病病人 (B)血糖通常高至 800mg/dL 以上  
(C)會出現脫水、皮膚與黏膜乾燥、電解質不平衡 (D)出現庫斯莫爾氏呼吸(Kuss- maul's breathing)
- A 52. 下列何者不是造成腦下垂體功能亢進症(Hyperpituitarism)常見的腦下垂體腺瘤？  
(A)黃體促素腺瘤(Luteinizing adenoma) (B)促乳素瘤(Prolactinoma)  
(C)促生長腺瘤(Somatotropic adenoma) (D)促皮質腺瘤(Corticotropic adenoma)。
- B 53. 有關尿崩症之護理措施，下列何者正確？(A)維持尿比重在 1.030~1.060 間  
(B)每小時測尿量，維持尿量 < 200mL/hr (C)每日測動脈血液氣體分析 (D)每日測四段血糖。
- C 54. 有關甲狀腺手術的敘述，下列何者錯誤？(A)手術後體溫升高，可能是甲狀腺風暴的徵象  
(B)行次全甲狀腺切除術的病人，可維持正常的甲狀腺功能 (C)手術後應禁止病人行深呼吸、咳嗽運動，以防牽拉傷口 (D)病人手術前持續服用抗甲狀腺藥物，可預防術後的甲狀腺風暴。
- B 55. 有關愛迪生危機(Addison's crisis)病人的臨床表徵，下列何者正確？①低血壓②心搏減慢③高血鉀④心臟衰竭⑤全身軟弱無力⑥腹部、背部及腿部疼痛：(A)①②③⑤(B)①③⑤⑥(C)②③④⑥ (D)③④⑤⑥。
- C 56. 下列何者不是嗜鉻細胞瘤(pheochromocytoma)之臨床表徵？(A)高血壓(B)高血糖(C)怕冷(D)多汗
- B 57. 下列有關輸血的描述，何者錯誤？(A)如果輸血之初 15 分鐘內沒有輸血反應，流速可以增加至醫囑所指示的流速 (B)如果用壓力氣囊來增加紅血球的流速，壓力不應超過 600mmHg  
(C)中央靜脈可以用來輸血 (D)對有過敏反應史的病人，可在輸血前 30 分鐘給予口服抗組織胺。
- D 58. 陳先生罹患急性骨髓性白血病(acute myelogenous leukemia; AML)，經化學治療後二星期，血小板數值為 18000/ $\mu$ L。其護理措施以下列何者最為適宜？(A)抽血穿刺之部位，應避免局部按壓  
(B)鼓勵多下床活動(C)建議以牙籤及牙線徹底清潔口腔(D)監測意識狀態，注意是否有中樞性出血。
- A 59. 有關何杰金氏症(Hodgkin's disease)最常出現的臨床徵象，下列何者不正確？(A)有明顯疼痛的頸部淋巴結腫大 (B)發燒、夜間盜汗 (C)嚴重搔癢、黃疸 (D)喝酒會引發腫大的淋巴結節處產生疼痛感。

- B 60.有關頸椎骨折病人穿著連頭圈式夾克 (Halo vest) 固定之護理處置，下列何者錯誤？  
 (A)使用酒精消毒四支骨釘，以免感染 (B)站著或坐著時若不舒服，可以將背夾 (vest) 打開調整  
 (C)轉身時應全身一起轉而不是只轉頭 (D)清潔 vest 時，請病人平躺，逐步鬆開兩邊的 vest。
- B 61.下運動神經元受損時膀胱的護理，下列何者正確？(A)以輕敲膀胱部位刺激排尿  
 (B)以 Crede's method 進行誘尿 (C)通常是 T6 以上受傷造成 (D)維持每天 1000 c.c.的飲水量。
- C 62.有關重積性癲癇 (status epilepticus) 的敘述，何者為是？①最常見的原因為抗痙攣藥物服用過量  
 ②是指癲癇持續的發作不停止③發作時最優先處理的是在口中置入壓舌板，避免咬到舌頭 ④發作時，需強行約束痙攣的肢體。(A)①④ (B)①③ (C)②③ (D)②④。
- D 63.有關重症肌無力的敘述，下列何者正確？(A)病患的疲倦及無力，在運動後會改善  
 (B)通常最早出現的症狀為四肢無力 (C)男性的罹病率高於女性 (D)主要以 Tensilon test 為診斷方。
- B 64.病患之格拉斯哥(GCS)昏迷指數為 9 分 (E<sub>4</sub>M<sub>3</sub>V<sub>2</sub>)，其會有下列何種反應？(A)對叫喚才能睜開眼睛  
 (B)發出難以理解的聲音(C)能正確算出 100 減 7 的答案(D)對痛刺激，肢體會出現異常的伸張姿勢
- C 65.有關腦膜炎的敘述，何者正確？(A)腦脊髓液 (CSF) 檢查結果蛋白質含量減少 (B)腦膜受刺激時出現克爾尼格氏徵象(Kernig's sign)(-)  
 (C)最重要的隔離措施是戴口罩 (D)單側瞳孔會擴大。
- C 66.王先生因缺血性中風住院，經電腦斷層檢查發現右側中大腦動脈阻塞，王先生最不可能出現的是下列何種症狀？(A)左腳肌肉力量 3 分(B)左手肌肉力量 0 分(C)失語症 (D)右側肢體肌肉力量 5 分
- B 67.下列何者不是腎臟製造的荷爾蒙？(A)前列腺素 (B)留鹽激素(C)腎素 (D)紅血球生成素
- B 68.有關靜脈腎盂攝影(IVP)的護理措施，下列何者正確？(A)檢查前，予Castor oil 30 c.c.以驅除腸內氣體  
 (B)檢查前，需評估個案對碘的過敏史並禁食6至8小時  
 (C)檢查後不可飲水，以免造成腎功能損傷 (D)檢查後，平躺並局部加壓4小時
- C 69.有關急性腎盂腎炎的臨床表徵，下列何者錯誤？  
 (A)紅血球沉降速率增加 (B)肋椎骨角(costovertebral angle)壓痛 (C)酮尿 (D) C-反應蛋白降低
- B 70.有關急性腎絲球腎炎之免疫反應機轉的敘述，下列何者正確？(A)腎小管因細菌及抗原反應而遭到阻斷  
 (B)抗原抗體所形成之免疫補體沉積於腎絲球微血管內皮導致炎症反應  
 (C)常見大腸桿菌感染而導致腎絲球發炎 (D)腎絲球內皮分泌蛋白分解酶導致腎絲球遭到破壞
- B 71.有關血液透析與腹膜透析的比較，何者正確？(A)腹膜透析比血液透析，較易導致透析不平衡症候群  
 (B)腹膜透析比血液透析，較易導致蛋白質流失 (C)血液透析比腹膜透析，較易導致高血脂症  
 (D)血液透析每週執行的次數多於腹膜透析
- A 72.對於採用連續性可活動式腹膜透析 (CAPD) 患者之飲食指導，下列何者錯誤？  
 (A)避免高鉀食物 (B)避免高磷食物 (C)攝取足夠蛋白質 (D)肉類食品選擇全瘦部分
- D 73.有關腎移植病患手術後的護理措施，下列何者正確？ (A)手術後初期尿液會呈現鮮紅色(B)尿管至少放置一星期，俟排尿量正常後，始可拔除(C)提供低鹽及低蛋白飲食 (D)進入病房者須戴口罩
- A 74.有關腎病症候群的護理措施，何者正確？(A)每日測量體重、腹圍，以監測體液平衡(B)嚴格限制水分攝取，以防尿量過多(C)採取低蛋白質飲食，以防蛋白尿(D)絕對臥床休息，以改善嚴重疲憊感
- B 75.有關原發性醛固酮過多症之臨床表徵，何者正確？(A)低血鈉(B)低血鉀(C)代謝性酸中毒(D)低血容積
- B 76.有關的護理措施，下列何者錯誤？ (A)罹患第二型單純性疱疹期間，應避免與人有親密性接觸  
 (B)帶狀疱疹與單純性疱疹皆由疱疹病毒引起 (C)帶狀疱疹病人病人可能會有神經痛的症狀，可給予適當的止痛藥物 (D)第一型單純性疱疹可能因唾液傳染
- A 77.有關疥瘡(scabies)之敘述，下列何者錯誤？(A)接觸疥蟲後 2 週左右會出現症狀 (B)疥蟲感染者使用過的床單，在 2 週內具有傳染力 (C)主要經由直接接觸皮膚或與病患共穿衣物感染加熱煮沸可以殺死疥蟲 (D)抗疥藥物須從頸部以下全身塗擦
- C 78.有關自體皮膚移植病人的護理措施，下列何者錯誤？  
 (A)評估植皮區是否有出血，以防移植皮膚無法成功黏合 (B)植皮區皮膚3~7 天要保持固定不動  
 (C)手術後供皮區要以壓迫性敷料加壓72 小時 (D)供皮區癒合後可使用乳液軟化此區
- B 79.有關 H1N1 新型流感之敘述，下列何者正確？(A)致病原是H 型流感病毒  
 (B)原本是一種在豬群中傳染的疾病(C)大部分的感染者症狀會迅速惡化轉為重症  
 (D)目前唯一的藥物是Oseltamivir (Tamiflu, 克流感)，但治療效果欠佳
- B 80.有關三度燒傷傷口的處置，下列何者錯誤？(A)可用水療來除去壞死組織、減少菌落，避免感染  
 (B)可用生物敷料長期覆蓋傷口，保護皮膚並減輕疼痛感，不需要進行植皮手術  
 (C)無法自行脫落或感染的壞死組織，可用擴創術來移除  
 (D)當環狀肢體因燒傷焦痂限制血液循環時，則須做焦痂切開術，避免組織缺血造成壞死。