

# 崇仁醫護管理專科學校 105 級護理師執照考

## <第 1 次模擬競試>

科目：基本護理學（共 4 頁） 班級： 姓名： 學號：

一、選擇題：每題 1.25 分，總分 100%

- D 1. 有關全責護理之敘述，下列何者錯誤？(A)整體性、連續性護理照護 (B)護理師能發揮獨立功能 (C)提供住院期間、出院後居家照護諮詢、返診及再入院的繼續服務 (D)處理病患事務決定權仍為護理長或小組長。
- D 2. 護理的範疇涵蓋那四種要素？(A)人、疾病、護理、環境 (B)疾病、健康、護理、環境 (C)病人、疾病、健康、護理 (D)人、環境、健康、護理。
- B 3. 每日給予癌症個案背部護理以緩解個案疼痛，是屬於下列何種措施？(A)合作性措施 (B)獨立性措施 (C)非獨立性措施 (D)相依性措施。
- A 4. 李奶奶 90 歲，不慎於浴室滑倒，致右股骨頸骨折，入院行人工髖關節置換手術，護理師為維護此個案之安全，下列敘述何者錯誤？(A)李奶奶為高危險性跌倒個案，應予以約束並限制下床活動 (B)隨時評估李奶奶翻身、活動及行走能力，適時給予協助 (C)夜間病房走道應加強照明，保持乾燥 (D)放低床的高度，並確實使用床欄。
- C 5. 下列對醫療環境中「濕度」與「溫度」的考量，何項敘述正確？(A)支氣管炎或呼吸道傳染疾病的患者，應提供低濕度的環境 (B)氣喘患者應提供高濕度的環境 (C)手術室的相對濕度應維持於 50%~70%之間 (D)甲狀腺機能亢進患者應升高室溫。
- C 6. 林小姐因中風導致右側肢體偏癱，住院期間有關病人之安全，下列敘述何者錯誤？(A)將常使用物品置於病人身體左側容易拿到之處 (B)浴室內放置止滑墊 (C)床面需要搖高避免病人自行下床 (D)病人臥床時應隨時拉起床欄。
- C 7. 有關留有病人體液污漬的玻璃引流瓶，其處置方式之敘述，何者正確？①屬於感染性可燃廢棄物 ②屬於感染性不可燃廢棄物 ③應置於黃色容器密封儲存 ④應置於紅色容器密封儲存 (A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④
- D 8. 在專業性人際關係建立過程中，下列敘述何者錯誤？(A)認識前期，護理人員可以藉由病歷來蒐集個案相關資料，以對個案有初步的認識 (B)認識期不可或缺的一項重要工作，即自我介紹 (C)工作期的主要任務是為病人制訂護理計畫的執行與評估 (D)關係結束期，是當病人出院，關係即告結束，為避免病人傷心，不需特別告知病人
- C 9. 下列何者屬於直接觀察法？①X 光片顯示左手臂骨折 ②呼吸音呈現囉音 ③皮膚冰冷 ④大便潛血反應：+ ⑤脈搏 96 次/分：(A)①②③ (B)①②④ (C)②③⑤ (D)③④⑤。
- A 10. 下列何者屬於主觀症狀(subjective symptoms)？①頭痛 ②左胸悶 ③全身無力 ④張口呼吸 ⑤呼吸不規律：(A)①②③ (B)②③⑤ (C)①③④ (D)②④⑤。
- C 11. 下列何者為「澄清」會談技巧之應用？(A)護理師：「你可以告訴我事情是如何進展的嗎？」 (B)護理師：「今天早上飯前血糖值很高，你一定有偷吃東西！」 (C)護理師：「我不太明白你所說的，可以請你再說清楚一點嗎？」 (D)護理師：「我看到你皺著眉頭沉思，我覺得你應該心情不好！」
- D 12. 有關行為過程記錄之書寫，下列敘述何者錯誤？(A)應採敘述性文字書寫法記錄 (B)會談後應儘早記錄，避免遺漏失真 (C)與病人對話之內容，記錄內容應真實 (D)如果病人情況許可，會談時間越久越詳細
- A 13. 有關護理記錄的方式，下列敘述何者正確？(A)D. A. R. T. 是以病人為中心的記錄法 (B)S. O. A. P. 是以醫療問題為導向的記錄法 (C)P. O. M. R. 是以資料來源為導向的記錄法 (D)系統性記錄法是以事情發生先後次序為導向的記錄法
- B 14. 下列有關護理記錄的描述，何者錯誤？(A)SOAP 的「A」為護理過程中「診斷」步驟 (B)焦點記錄的「D」相當於 SOAPIER 記錄的「P 及 I」 (C)SOAPIER 記錄的「I」相當於焦點記錄的「A 及 T」 (D)焦點記錄「R」及 SOAP 記錄「E」為護理過程中「評估」步驟。
- C 15. 有關「醫囑」的敘述，下列何者正確？(A)S.O.S. 屬於臨時醫囑，病人有需要時給予一次，若超過 24 小時未執行則自動失效 (B)緊急狀況時，護生可以接受醫師口頭或電話醫囑，於事後儘快請醫師補開醫囑 (C)醫囑單上 Order Renew 以後的醫囑是有效的，Order Renew 以前的醫囑自動失效 (D)p.r.n. 屬於臨時醫囑，在開立 p.r.n. 醫囑時，需註明間隔多久時間可以給予一次。
- D 16. 病人使用氧氣時的潮濕瓶是屬於感染鏈中的那一個因素？(A)感染原(agent) (B)易感性宿主(host) (C)進入宿主的入口(entrance into the host) (D)感染窩(reservoir)。
- A 17. 有關無菌物品的操作使用，下列敘述何者正確？(A)手持無菌敷料鉗時，需握鑷子的上 1/3 處 (B)從泡鑷罐取出無菌敷料鉗時，鉗尖須保持開立狀態 (C)手持無菌棉球罐蓋時，蓋口需朝上，保持在腰部以上 (D)打開無菌棉球罐時，手持蓋子邊緣處，以利旋轉。
- A 18. 臨床上最適合用於精密儀器，如內視鏡、心導管、呼吸治療器材等之滅菌方法為：

- (A)氧化乙烯氣體滅菌法 (B)乾熱滅菌法 (C)高壓蒸氣滅菌法 (D)煮沸法。
- D 19.有關煮沸法的說明，下列何者正確？(A)物品放置後可重疊 (B)可使用此法消毒尖銳物品 (C)消毒時，鍋內的水位須剛好蓋過欲消毒物品 (D)鍋內的水位不可超過鍋子的 2/3 深度。
- B 20.下列何種情況符合醫療照護相關感染(healthcare-associated infection; HAI)之定義？(A)肝癌病人接受動脈血管栓塞治療的隔日，出現體溫上升情形 (B)剖腹產新生兒出生後第 48 小時臍帶感染 (C)出生 36 小時被診斷感染德國麻疹的新生兒(D)服用類固醇藥物後發生帶狀疱疹入院診治的病人。
- B 21.下列各項預防疾病傳染的方式，何者主要作用不是用於阻斷傳染鏈之傳染途徑？  
(A)血品檢驗以預防經由輸血感染 C 型肝炎 (B)在環境中噴灑消毒劑以預防禽流感病毒傳染  
(C)提供免費消毒針具給毒癮者使用以預防愛滋病傳染 (D)避免餵食與接觸禽鳥以預防禽流感。
- C 22.呼吸測量方式之注意事項，不包括？(A)一般男性採腹式呼吸，女性多採胸式呼吸  
(B)測量前協助病人採放鬆舒適的姿勢 (C)向病人解釋測量目的並知會何時要開始測量  
(D)配合觀察技巧注意呼吸的頻率、深度和病人的臉色等。
- A 23.有關測量呼吸之敘述，何者有誤？(A)呼吸次數是指 30 秒內病人胸壁起伏次數 (B)測量呼吸時不需要特別向病人說明 (C)胸壁一起一伏算為一次呼吸 (D)男性多為腹式呼吸，女性多為胸式呼吸。
- B 24.何種測量步驟可能會造成血壓假性偏高？  
(A)選擇的壓脈帶太寬 (B)壓脈帶綁太緊 (C)受測手臂低於心臟位置 (D)測量者視線高過水銀柱。
- D 25.通常成年人測量血壓，舒張壓之判讀，是以柯氏音哪一期的讀數為準？  
(A)第二期 (B)第三期 (C)第四期 (D)第五期。
- C 26.量體溫的注意事項下列何者錯誤？(A)新生兒上不會翻身者可量背溫  
(B)劇烈運動後須待 15 至 30 分鐘後再量體溫 (C)三歲以下的幼兒測量耳溫應將耳翼往上向後拉  
(D)身體虛弱腋下無法夾緊體溫計的個案不適合量腋溫。
- A 27.為麥女士測量脈搏時，發現其脈搏細快、不規則，因有時快至無法正確測量，連續兩次測量各為 152 次/分、160 次/分，此可能為：(A)跑脈(running pulse) (B)奇異脈(paradoxical pulse)  
(C)柯利氏脈(Corrigan's pulse) (D)脈搏短絀(pulse deficit)。
- B 28.有關睡眠週期的描述，下列何者正確？(A)在整個 8 小時睡眠中，會經歷一個非快速動眼期及一個快速動眼期(B)一個完整四階段非快速動眼期及快速動眼期之循環歷時約 70~90 分鐘(C)睡眠起始會先進入快速動眼期，再進入非快速動眼期(D)睡眠者於任何睡眠週期清醒，再入睡可接續原先的睡眠週期。
- D 29.氣喘、顛癇、消化性潰瘍或心絞痛常發作的階段，是睡眠週期的那一期？  
(A)NREM II (B)NREM III (C) NREM IV (D) REM。
- C 30.有關睡眠呼吸暫停之敘述，下列何者錯誤？(A)此情形常在 NREM IV 發生(B)常伴隨著嚴重的失眠狀況  
(C)阻塞性睡眠呼吸暫停常發生於老年人 (D)好發於中年男性及停經後婦女。
- B 31.有關護理過程的敘述，下列何者錯誤？(A)是一種科學化的問題解決法 (B)是協助護理對象治癒疾病的方式 (C)是促進護理對象達到健康安適狀態的過程 (D)必須隨時評值、調整及矯正。
- A 32.決定護理診斷優先次序時，下列敘述何者錯誤？(A)護理人員自覺最重要的問題優先解決 (B)威脅病患生命的健康問題優先解決(C)依馬斯洛人類基本需求理論來排定(D)護理對象的自我感受調適因素。
- B 33.下列何者不屬於護理問題？(A)知識缺失 (B)泛焦慮症 (C)皮膚完整性受損 (D)急性疼痛
- B 34.下列哪些病人容易有口腔黏膜改變的問題，需給與特別口腔護理？①張口呼吸者 ②昏迷者  
③腹部手術者 ④化學治療者。(A) ①②③ (B) ①②④ (C) ①③④ (D) ②③④。
- C 35.個案仰臥時，下列何者並非其維持姿勢的原則？(A)頭、頸間下可墊枕頭以促進舒適  
(B)頭、頸與脊柱需呈一直線(C)枕頭墊於膝脛下，以放鬆腹肌(D)手握小捲軸，以防腕關節過度屈曲。
- A 36.有關舒適姿勢的敘述，下列何者最正確？①呼吸困難病人應採取高坐式②女病人導尿採取辛氏臥式③肛門檢查病人採取膝胸臥式④意識不清病人採取屈膝仰臥式。(A)①③ (B)①④ (C)②③ (D)②④。
- D 37.有關假牙的護理，下列何者正確？  
(A)為減少細菌的孳生，假牙平時應以熱水清洗 (B)為避免牙齦萎縮，應建議夜間就寢時佩戴  
(C)固定式假牙的清潔方式與活動性假牙一樣 (D)活動假牙材質為硬橡皮，不戴時應泡於含水容器。
- B 38.有關姿勢擺位，下列何者正確？(A)屈膝仰臥式(dorsal recumbent position)可用於改善子宮後傾引起之經痛(B)辛氏臥式(Sim's position)可用於引流昏迷或吞嚥困難病患的口鼻分泌物(C)膀胱截石術式(lithotomy position)可用於促進產後子宮復原(D)膝胸臥式(knee-chest position)可用於生殖器官檢查。
- B 39.下列何者不是長期臥床對心臟血管系統造成的影響？(A)姿位性低血壓 (B)減少心臟負擔  
(C)形成靜脈血栓 (D)增加伐耳沙伐氏操作(Valsalva maneuver)機會。
- A 40.有關護理人員協助移動病患時，下列敘述何項錯誤？(A)儘可能使用小肌肉以減少疲勞，故彎曲膝關節比彎腰好 (B)彎曲膝關節，降低重心，可以節省力量 (C)移動病患時，使用手肘、臀部或大腿肌肉的力量取代背肌 (D)儘量使用拉與滑動方式以節省體力及避免扭傷。
- C 41.有關長期臥床病患容易造成負氮平衡的原因，下列何者正確？(A)細胞代謝加速  
(B)攝取過多高熱量食物 (C)體內肌肉蛋白質不斷被分解 (D)攝取過多高蛋白食物。
- A 42.有關影響病患活動的因素，下列何者錯誤？(A)每週至少 3 次每次至少 30 分鐘的無氧運動，可以降低

- 活動後之損傷 (B) 有家人的支持將有助於提升病患的活動率 (C) 老年人因骨質密度降低及關節彈力減弱致步態不穩而影響其活動 (D) 長期使用類固醇之病患會出現肌肉無力而影響其活動。
- B 43.** 下列何者並非長期臥床之合併症？(A) 便秘 (B) 低血鈣 (C) 姿位性低血壓 (D) 墜積性肺炎。
- A 44.** 陳小姐身上存留導尿管留置，護理師給予會陰部清潔。下列有關會陰部清潔之敘述何者較為合適？  
(A) 沖洗順序為尿道口→遠側小陰唇→近側小陰唇→遠側大陰唇→近側大陰唇 (B) 沖洗壺口朝向床尾，沖洗棉枝以沖洗至乾淨再丟棄 (C) 準備會陰沖洗用物，並協助採左側臥式 (D) 採內科無菌技術操作
- C 45.** 李小姐明天預行腹部手術，術前醫囑：「S. S. enema st.」，下列敘述何者正確？  
(A) 液面至肛門垂直距離 30~40 公分 (B) 灌腸時請李小姐右側臥  
(C) 肛管插入肛門 7.5~10 公分 (D) 灌腸液保留在腸道 15~30 分鐘後再排出。
- A 46.** 有關正常的排便機轉，下列敘述何者正確？(A) 胃結腸反射可引起副交感神經興奮而促發腸道的質塊運動 (B) 直腸壓力上升至 20~30 mmHg 時會引發直腸排便反射  
(C) L2~L4 是排便反射中樞刺激交感神經反射興奮 (D) 肛門內括約肌收縮、外括約肌放鬆可引發排便。
- D 47.** 蔣奶奶 16 小時未解尿，膀胱脹，經誘尿無效需導尿。下列護理措施何者較不適當？  
(A) 可採用單次導尿 (B) 選擇 14 Fr. 導尿管 (C) 導尿管插入 5 公分 (D) 一次導出所有尿液。
- B 48.** 高纖維飲食的主要應用原理，下列何者錯誤？(A) 增加腸道內水分的吸收 (B) 減少腸道內的殘渣量  
(C) 縮短腸道內殘渣停留時間 (D) 促進腸道的蠕動。
- B 49.** 有關護理腹瀉病人的原則，下列敘述何者錯誤？  
(A) 教導病人注意活動時的安全，以免眩暈跌倒 (B) 限制病人每日的攝取水量，以免腹瀉情形加重  
(C) 教導病人執行肛門的皮膚護理，以免皮膚破損 (D) 限制病人攝取的食物種類，必要時依醫囑 NPO。
- B 50.** 健康中心護理師協助王小弟包紮受傷部位，護送王小弟就醫過程中，發現王小弟下肢肢體出現何種現象時，表示繃帶過緊，需要重新打開再包紮？  
(A) 肢體末梢皮膚顏色紅潤 (B) 肢體末梢脈搏變弱 (C) 肢體末梢溫暖 (D) 結帶處繃帶鬆脫。
- D 51.** 有關正確包紮的原則，下列何者正確？(A) 以 8 字形包紮法定帶 (B) 包紮時應從近心端往遠心端包紮  
(C) 包紮完成 30 分鐘後進行第一次評估 (D) 包紮第二圈應覆蓋前一圈範圍的 1/2~2/3。
- A 52.** 張先生因車禍右手臂骨折，欲用三角巾懸吊手臂時，須注意下列何者？①在頸後結帶 ②使肘關節彎曲度應小於 90 度 ③手腕應高於肘關節 ④一般三角巾之底邊(最長邊)應置於張先生的右側。  
(A) ②③ (B) ①④ (C) ①③ (D) ②④。
- D 53.** 在進行遺體護理時，下列敘述何項錯誤？  
(A) 護理人員應戴上手套，避免接觸遺體體液 (B) 遺體成仰臥姿勢，頭下放置枕頭可預防臉色變黑  
(C) 臀部可放置看護墊，以避免尿液糞便排出 (D) 將假牙拔除，以避免屍僵後無法移除。
- C 54.** 有關臨終病人呈現的生理徵象，下列何者正確？(A) 脈搏漸轉弱，出現洪脈(bounding pulse)  
(B) 先由軀幹中心體溫下降 (C) 因 CO<sub>2</sub> 滯留呈現張口呼吸 (D) 頸動脈搏動比心尖脈搏動較晚消失。
- B 55.** 有關臨終病人的照護重點，下列哪些措施正確？①維持病房燈光昏暗，以減少對病人之眼睛刺激  
②有劇烈疼痛時，避免使用嗎啡性止痛藥，以減少呼吸抑制 ③請家屬盡量以觸摸或按摩方式表達對病人之關愛 ④避免於病床邊竊竊私語，以減少病人之焦慮感 (A) ①② (B) ③④ (C) ①③ (D) ②④。
- C 56.** 有關血液培養檢體收集之敘述，下列何者正確？①於靜脈輸注部位上方約 3~5 公分處採血  
②以 75% 酒精棉棒在採血部位由內向外環型消毒皮膚三次 ③抽血時針頭斜面向上與採血處呈 15-30 度角插入靜脈血管 ④抽血後須更換針頭再注入培養瓶 ⑤先注入厭氧瓶再注入需氧瓶。  
(A) ①②③ (B) ②③④ (C) ③④⑤ (D) ①④⑤。
- D 57.** 關於尿液檢體採集，下列敘述何者正確？(A) 24 小時尿液檢體是收集病人早晨 7 點所解的尿至隔天早上 7 點所解的尿 (B) 收集存留導尿管病人之檢體，須先夾住引流管約 15~30 分鐘後，打開尿管與尿袋接口處倒出尿液 (C) 採集女性尿液培養檢體，須先以肥皂水清洗後，繼以優碘藥水消毒會陰部，再行收集中段小便 (D) 單次尿液檢體若無法於 30 分鐘內送檢，則應置於冰箱冷藏保存。
- A 58.** 有關痰液檢體收集送檢，下列敘述何者正確？  
(A) 若咳不出痰液時，可利用震顫叩擊方式 (B) 告知早上起床後可先刷牙，再留第一口痰  
(C) 痰液如果無法馬上送檢，應存放於冷凍庫內 (D) 若無法咳嗽，可以棉棒沾口腔內之痰液作為檢體。
- A 59.** 有關病人入院護理的敘述，下列何者正確？(A) 自我介紹及觀察病人是首要的護理活動 (B) 護理師可代為保管重要物品，並請家屬點交清楚 (C) 進行資料評估及會談時，請家屬離開病室，由病人自行回答 (D) 入院 24 小時內應填妥護理病歷，包括社會心理史、性生活。
- C 60.** 有關動脈血液氣體分析之血液採集過程的敘述，下列何者正確？  
(A) 抽血前 15 分鐘暫停氧氣使用 (B) 穿刺股動脈需評估亞倫氏試驗 (Allen's test)  
(C) 用針筒內含有 heparin 的特製空針進行抽血 (D) 檢體放置室溫下並立即送檢。
- C 61.** 頭部不宜直接使用熱療法的原因，下列何者正確？(A) 會降低微血管通透性，抑制血管和組織間液體的交換，造成腫脹 (B) 會使血循環降低，使供給腦細胞氧氣和營養不足，而導致代謝速度變慢  
(C) 會使頭部顱內壓上升，產生頭痛、噁心嘔吐、甚至引起腦充血  
(D) 會降低破壞酶 (destructive enzymes) 的活性，增加對腦細胞的破壞。

- C 62.**李奶奶 90 歲，有中風的病史。因泌尿道感染住院治療，瘦弱，皮膚薄，常常四肢冰冷、忽冷忽熱，發燒時會有意識混亂的情形。有關病人之冷熱護理，何者較適當(A)發冷時熱水浸泡為較佳選擇 (B)發高燒時給予酒精拭浴為佳(C)使用乾熱時，宜低於成人建議溫度 5°C(D)持續於四肢放置熱水袋保暖
- B 63.**人體對於用冷所產生的生理反應，下列敘述何者正確？①血液黏稠度增加②刺激副交感神經，產生雞皮疙瘩③血管收縮，血壓上升④淋巴流動與白血球機動性增加(A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④。
- B 64.**有關冷熱應用原理與對人體生理變化的敘述，下列何者正確？  
(A)使用電暖器是以傳導的方式進行能量轉移 (B)冷接受器的數目是熱接受器的 8~10 倍  
(C)皮膚可忍受的溫度範圍為 15~55°C (D)熱接受器分佈於真皮上層(乳頭狀層)。
- C 65.**高蛋白飲食的適用對象，不包括下列何者？  
(A)發燒的病人 (B)燙傷的病人 (C)肝昏迷的病人 (D)肺部感染的病人。
- B 66.**確認鼻胃管位置正確的方法，下列何者錯誤？  
(A)反抽有胃液或殘餘食物 (B)灌入 10 c.c. ~ 20 c.c.生理食鹽水，有咳嗽反應  
(C)將鼻胃管末端置於水中沒有產生氣泡(D)快速打入 10 c.c.~20 c.c. 空氣，胃部可聽診空氣的聲音
- D 67.**有關全靜脈營養療法(TPN)的合併症，下列何者錯誤(A)空氣栓塞 (B)敗血症 (C)高血糖 (D)低血鉀
- B 68.**有關管灌飲食的敘述，下列何者錯誤？(A)溫度：37.8~40.5°C (B)高度：液面與胃距離 15~20cm  
(C)每次灌食量：250~300mL (D)每次灌食時間：15~20 分鐘。
- C 69.**病人於鼻胃管灌食後產生腹瀉，其可能的原因為下列何者？①灌食姿勢不當②灌入太多空氣③灌注速度太快④有乳糖不耐症：(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④。
- D 70.**確保給藥之有效及病人安全，有關給藥護理之敘述，下列何者正確？(A)耳滴劑應於冰箱冷藏保存，給藥時再直接由冰箱取出滴入耳內 (B)注射 penicillin G 前，先作盤尼西林皮膚試驗，呈陽性方可給藥  
(C)給予咳嗽藥水時，協助病人稀釋並以開水服用 (D)口服給藥時協助病人以坐姿、半坐臥或站姿服藥。
- B 71.**醫生為 12 床李思絲小姐開立臨時醫囑「1300 penicillin skin test」後，護理人員於下午 1 點 10 分以空針抽取 penicillin 1 vial(5mL)為 12 床李思絲小姐執行肌肉注射。上述給藥過程，護理人員違反了哪幾項給藥的「五對」原則①時間②劑量③途徑④藥物⑤病人：(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)④⑤。
- B 72.**有關給藥的敘述，下列何者正確？  
(A)眼睛滴藥若同時有水劑和油劑，應先給油劑 (B)給幼兒耳滴藥前應先將患耳耳垂向下向後拉  
(C)給予兒童直腸栓劑應推入肛門內約 2~3 公分 (D)栓塞劑類藥物應保存於冰箱的冷凍庫中。
- C 73.**協助患者肌肉注射時，下列那一個步驟錯誤(A)以 75%酒精棉球，由注射部位環形向外消毒皮膚 3 吋  
(B)繃緊注射部位皮膚，以 90 度方向迅速下針 (C)回抽針心，若未見血，即可快速推藥液注入  
(D)注射完藥液，取乾棉球輕按注射處，並快速拔出針頭。
- B 74.**吳老先生因病須服用 Prednisolone，有關藥物服用的注意事項，下列何者正確？  
(A)須於飯前空腹時服用，以免影響藥物吸收 (B)須於餐後立即服用，以免刺激胃黏膜  
(C)須於飯後 2 小時服用，以免胃酸破壞療效 (D)須於飯前 1/2 小時服用，以刺激腸胃蠕動。
- A 75.**對於痰多不易咳出的病人，給予蒸氣吸入之目的，下列何者正確？①以蒸氣方式將熱應用於呼吸道部位②濕潤呼吸道黏膜，稀釋分泌物③提供濕度，增加血氧濃度④藉此提供擬副交感神經藥物，讓支氣管鬆弛(A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④。
- D 76.**有關使用冰枕的注意事項，下列何者正確？①使用冰枕不需要醫囑 ②冰枕內碎冰塊需加水，以延長冷療時間 ③置放夾子之前，需將空氣排出以免影響傳導效果 ④用冷後應每隔 5 分鐘，觀察治療部位皮膚狀況 (A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- C 77.**人體在脫水情況下會透過下列那一項機制以增加腎小管吸收水分？  
(A)血漿滲透壓下降促使 ADH 分泌增加 (B)血漿滲透壓下降促使 ADH 分泌減少  
(C)血漿滲透壓上升促使 ADH 分泌增加 (D)血漿滲透壓上升促使 ADH 分泌減少。
- A 78.**下列輸血注意事項何者錯誤？(A)交叉試驗中，供血者的血清和受血者的血球不凝集即可  
(B)輸血前後僅能使用 0.9%食鹽水溶液 (C)每單位的血製品應於 4 小時內輸完  
(D)輸血後 15 分鐘無不良反應，可將滴數調為 40~60 滴/分。
- D 79.**下列何者為高血鈉病人常見的症狀？  
(A)體溫下降 (B)姿位性低血壓 (C)尿量增加、尿比重減少 (D)皮膚與黏膜乾燥。
- B 80.**下列何者為高血鉀和低血鉀的病人皆會出現的症狀或徵象？①深部肌腱反射喪失②噁心③心律不整  
④腸蠕動減少(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)①④。