

崇仁醫護管理專科學校 105 級護理師執照考

<第 1 次模擬競試>

科目：產兒科護理學（共 4 頁）

班級：

姓名：

學號：

一、選擇題：每題 1.25 分，總分 100%

- A** 1. 下列何者為友善生產之概念？①產婦可決定生產陪伴者以獲支持②允許待產婦自由走動以促進舒適③建議使用止痛藥及麻醉劑降低不適④建議待產時禁食以降低生產風險。
(A) ①② (B) ①③ (C) ②③ (D) ②④。
- A** 2. 有關卵子形成 (oogenesis) 的敘述，下列何者正確？(A)女性在胎兒時期就已經開始有卵原細胞 (oogonia) 的形成 (B)卵細胞第一次減數分裂是發生在受精時 (C)形成一個單套的卵，需經過一次有絲分裂與一次減數分裂 (D)整個卵母細胞分裂的過程共產生了一個單套的卵及一個極體 (polar body)。
- D** 3. 有關孕期婦女之生理變化，下列何者為異常？(A)臉頰及鼻子產生黃褐斑 (chloasma) (B)胸部、頸部出現放射狀小紅點，即血管蜘蛛痣 (vascular spider nevi) (C)心跳速率平均每分鐘增加 10~15 次 (D)陰道分泌物量增加，顏色由白色轉為黃綠色。
- A** 4. 李女士，妊娠 28 週，有 1 個女兒及 1 對雙胞胎，曾於妊娠 8 週自然流產 1 次，孕產史的紀錄為：
(A) G4P2A1 (B) G3P3A1 (C) G4P3A1 (D) G3P2A1。
- A** 5. 孕期婦女需增加碘的攝取，主要促進胎兒何部分的發育？
(A)腦部神經發育 (B)肺泡細胞發育 (C)腎上腺發育 (D)腸道細菌叢發育。
- A** 6. 有關海洋性貧血之敘述，下列何者錯誤？(A)海洋性貧血屬於體染色體顯性遺傳 (B)監測平均紅血球體積 (MCV) 為海洋性貧血篩檢的第一步驟 (C)若夫妻為同一型的帶因者，則孕婦可接受羊膜穿刺以利產前診斷 (D)若夫妻為同一型的帶因者，胎兒可能罹患重型海洋性貧血的機會是 1/4。
- A** 7. 有關孕期心臟病之敘述，下列何者錯誤？(A)懷孕 38~40 週時心臟負荷最大 (B)孕婦易早產及流產 (C)懷孕體重增加控制於 10 公斤左右 (D)每餐飯後至少半小時躺下休息。
- C** 8. 有關葡萄胎之描述，下列何者錯誤？(A)因滋養層絨毛增加，血清 HCG 值偏高 (B)陰道出血是常見的臨床症狀 (C)衛教婦女 1 年內盡快懷孕以平衡荷爾蒙 (D)完全型葡萄胎呈現囊泡狀，含雙套染色體。
- B** 9. 王女士，懷孕 30 週，陰道突然有無痛性鮮紅色出血，其最有可能是下列何種情況？
(A)早期破水 (B)前置胎盤 (C)胎盤早期剝離 (D)植入性胎盤。
- A** 10. 重度子癩前症之 HELLP 症候群，有關「H」之敘述，下列何者正確？(A)小血管的溶血性貧血 (B)血球容積下降 (C)紅血球變大，且形狀規則 (D)凝血酶原時間大幅下降。
- A** 11. 下列妊娠期間感染 TORCH 症候群之敘述，何者正確？(A)孕期 18 週內，胎盤內滋養層細胞對胎兒有保護作用，故感染梅毒螺旋體不會影響胎兒健康 (B)若未具德國麻疹抗體且確定未懷孕者，可接種疫苗，但是須在接種 2 週後才可懷孕 (C)為避免感染巨細胞病毒，孕婦應避免與貓狗等寵物糞便接觸的機會 (D)疱疹病毒 (HSV-II) 多是經由胎盤傳給胎兒，易導致胎兒肝脾腫大，甚至死亡的後果。
- C** 12. 子宮生理性收縮環在肌肉上的變化為何？(A)子宮上段變薄，下段變厚 (B)子宮上段變薄，下段沒有變化 (C)子宮上段變厚，下段變薄 (D)子宮上段沒變化，下段變薄。
- D** 13. 下列哪種胎頭徑線最短？
(A)雙頂徑 (BPD) (B)枕額徑 (OM) (C)枕額徑 (OF) (D)枕下前囟徑 (SOB)。
- C** 14. LOA 在內診時會發現下列何者？(A)前囟門在孕婦恥骨的左側 (B)前囟門在孕婦恥骨的右側 (C)前囟門在孕婦薦骨的右側 (D)前囟門在孕婦薦骨的左側。
- B** 15. 林女士第一胎，懷孕 40 週因自然破水入院，依醫囑使用催產素。護理師發現胎心率出現晚期減速，此時最優先的護理措施為何？
(A)測量血壓、脈搏、呼吸 (B)停止催產素滴注 (C)先密切觀察 30 分鐘 (D)採膝胸臥式。
- A** 16. 有關待產婦護理之敘述，下列何者正確？(A)鼓勵定時解尿，以利胎兒下降 (B)維持平躺，可促進血液循環 (C)預防噁心嘔吐，應該要禁食 (D)灌腸是避免產時污染的必要護理措施。
- B** 17. 有關胎心音於子宮收縮時的變化，下列何項表徵為異常？(A)胎心音減速出現於宮縮開始時，最低點為 110 bpm，宮縮結束後回到 137 bpm (B)胎心音減速出現於宮縮最高點，最低點為 80 bpm，宮縮結束後回到 120 bpm (C)胎心音加速隨著宮縮開始後出現，最高點為 165 bpm，宮縮結束後回到 145 bpm (D)胎心音隨宮縮出現加速或減速，但一直維持在 120~160 bpm 之間。
- C** 18. 下列有關胎兒心跳之描述，何者正確？(A)晚期減速的現象是因為臍帶受壓迫所致 (B)早期減速的現象是因為胎盤功能不良所致 (C)正常胎兒在陣痛時，會出現暫時性缺氧及心跳加快現象 (D)正常胎心率約在 120~160 次/分，妊娠週數越小，心跳越慢。
- B** 19. 江女士第一胎，目前子宮頸開 10 公分，胎頭高度為 +1，有便意感，此時最合宜之護理措施為何？
(A)運用呼吸方法以避免用力 (B)教導用力 (C)給予氧氣 (D)按摩腹部皮膚以轉移其注意力。

- C 20.** 有關衛生福利部推動的母嬰親善醫院十大措施，下列何者錯誤？(A)提倡產後盡早哺餵母乳 (B)依嬰兒的需求哺餵母乳 (C)提供嬰兒安撫奶嘴 (D)實施24小時親子同室。
- B 21.** 黃女士表示當她想到寶寶時，會感覺到乳汁排出 (let-down reflex)，此種反應，主要是下列何者的作用？(A)泌乳激素 (prolactin) (B)催產激素 (oxytocin) (C)雌性素 (estrogen) (D)黃體素 (progesterone)。
- B 22.** 有關霍曼氏試驗 (Homan's test) 之敘述，下列何者錯誤？(A)須讓個案的腳板向背側彎曲 (B)在縮短腓腸肌以壓迫深部靜脈 (C)主要測試是否有深層靜脈血栓 (D)陽性反應為發生疼痛反應。
- A 23.** 林女士採陰道生產，會陰四度裂傷。在產後第2天可以教導她執行何項產後運動？(A)乳(胸)部運動 (B)膝胸臥式運動 (C)抬腿運動 (D)仰臥起坐。
- D 24.** 有關哺餵母乳時，嬰兒吸吮的正確姿勢，下列敘述何者錯誤？(A)兩頰圓鼓 (B)下嘴唇外翻 (C)頭部及下巴成一直線 (D)嘴巴下方的乳暈露出較多。
- C 25.** 有關母乳的保存，下列敘述何者正確？(A)初乳於室溫下只能存放6小時 (B)成熟乳在室溫下可以存放24小時 (C)成熟乳置放於冰箱4°C內冷藏，可以存放五天 (D)成熟乳置放於冰凍庫內，可以存放三個禮拜。
- C 26.** 劉女士第一胎，依據魯賓 (Rubin) 對產後婦女行為態度之研究結果判斷，下列敘述何者表示劉女士處於接受期 (taking-in phase)？(A)寶寶為什麼一直睡覺？ (B)我要怎麼樣才能讓奶水量增加？ (C)生小孩好痛，下次再也不要生了 (D)我的先生晚上照顧寶寶，現在他很累。
- B 27.** 若待產婦有臍帶脫垂的情況時，應避免採用下列哪一種姿勢？(A)膝胸臥式 (B)半坐臥式 (C)垂頭仰臥式 (D)下肢抬高之側臥式。
- C 28.** 孕婦在待產時，突然感覺腹部一陣劇烈陣痛，接著宮縮停止，而且無法測到胎心音。此情況可能是發生了下列何種情形？(A)低張性子宮收縮 (B)早期破水 (C)子宮破裂 (D)羊水栓塞。
- C 29.** 黃女士G2P2，剖腹生產術後第一天，已排氣，開始進食之初，下列何項食物較為適合？(A)生化湯 (B)麻油雞 (C)新鮮果汁 (D)米飯麵包。
- A 30.** 高女士已超過預產期3天，醫師建議入院引產，下列敘述何者正確？(A)比夏計分 (Bishops core) ≥ 6 分，引產較可能成功 (B)使用催產素 (oxytocin) 會增加排尿量，需觀察輸出入液量 (C)前列腺素主要是刺激血管平滑肌，促使子宮規律收縮 (D)若胎位不正時建議採人工破水引產。
- B 31.** 下列有關催產素 Oxytocin 使用之敘述，何者正確？(A)胎心率過慢時仍可繼續使用，但須密切觀察 (B)胎心率變異性減速時，應立即停止使用 (C)可連續滴注 72 小時，漸進性增加劑量 (D)因具利尿作用，易發生尿崩之合併症。
- A 32.** 乳腺炎 (mastitis) 與乳房充盈 (engorgement) 之比較，下列何者正確：①患乳腺炎時通常為單側，乳房充盈為雙側 ②患乳腺炎及乳房充盈之個案，皆有可能發燒 ③患乳腺炎及乳房充盈之個案，皆感覺乳房腫脹與疼痛 ④二者皆易發生於產後 1~4 週。(A)①②③ (B)②③④ (C)①③④ (D)①②④。
- C 33.** 下列何者為嚴重產後出血的徵象？(A)收縮壓與舒張壓均下降 15 mmHg (B)心跳次數為 60 次/分 (C)失血超過 1,000 c.c. (D)體溫為 100.6°F。
- B 34.** 張女士採陰道生產，預計 3 年後再生育，未母乳哺餵，有子宮外孕的病史，懷孕前月經不規則。下列何種避孕方式較為適當？(A)子宮內避孕器 (B)口服避孕藥 (C)月經週期法 (D)結紮。
- A 35.** 下列何項不屬於排卵機能檢查？(A)子宮輸卵管攝影 (B)黃體素濃度檢查 (C)雌激素濃度檢查 (D)基礎體溫測量。
- A 36.** 有關結紮手術之敘述，下列何者正確？(A)女性結紮可於產後 24~48 小時內實施 (B)女性結紮後不會再製造卵子 (C)男性結紮後立即有避孕效果 (D)男性結紮後容易有腹腔沾黏的情形。
- B 37.** 下列何項婦科疾病與子宮內膜異位有關？①卵巢巧克力囊腫②絨毛膜癌③子宮腺肌症④骨盆腔發炎。(A)①② (B)①③ (C)②③ (D)②④。
- A 38.** 卵巢癌早期不易被發現，晚期因壓迫骨盆腔器官才容易出現症狀，其臨床表徵經常包括下列何者？①腹脹②腹水③性交後出血④月經量多⑤頻尿⑥陰道分泌物增加。(A)①②⑤ (B)①③⑥ (C)③④⑤ (D)④⑤⑥。
- C 39.** 李女士，50歲，近6個月出現臉潮紅、心悸、月經週期不規則、月經量少且顏色淡，進入更年期。李女士生殖內分泌系統的變化，包括下列何者？①黃體素分泌增加②雌性素分泌減少③黃體生成素 (LH) 分泌減少④濾泡刺激素 (FSH) 分泌增加。(A)①④ (B)②③ (C)②④ (D)③④。
- D 40.** 王女士罹患上皮性卵巢癌，已完成手術和化學治療，為了追蹤腫瘤復發可能性，須監測下列何種腫瘤指標？(A)鱗狀細胞癌抗原 (SCC-AG) (B)血清CA-153 (C)人類絨毛膜性腺激素 (HCG) (D)血清CA-125。
- D 41.** 下列何種先天性心臟病，會有上肢血壓較下肢高的現象？(A)心室中隔缺損 (B)大血管轉位症 (C)法洛氏四重畸形 (D)主動脈狹窄。
- A 42.** 下列何者為川崎氏症 (Kawasaki disease) 病童的急性期症狀？(A)草莓狀舌 (B)腳趾末端脫皮 (C)關節痛 (D)冠狀動脈病變。

- B 43.** 有關鎌狀細胞貧血病因之敘述,下列何者正確?(A)紅骨髓被破壞或功能受抑制所致 (B)正常血紅素的結構被異常的血紅素S (HgbS) 所取代 (C)鐵的攝取不足 (D)性染色體顯性遺傳。
- A 44.** 有關鎌狀細胞貧血病因之敘述,下列何者正確?(A)紅骨髓被破壞或功能受抑制所致 (B)正常血紅素的結構被異常的血紅素S (HgbS) 所取代 (C)鐵的攝取不足 (D)性染色體顯性遺傳。
- C 45.** 王小弟,3 歲半,最近一週,母親發現其體重快速增加,而且早晨起床後,臉部特別浮腫尤其是眼眶周圍,並且情緒易怒不安,且較嗜睡。則其可能是罹患:(A)腹膜炎 (B)腹股溝疝氣 (C)腎病症候群 (D)急性腎衰竭。
- A 46.** 林小妹罹患先天性髖關節脫位。當其3 個月大時,下列何種徵象會消失?(A)歐氏徵象(Ortolani's sign) (B)葛氏徵象(Galeazzi's sign) (C)哈特氏徵象(Hart's sign) (D)艾利司氏徵象(Allis' sign)
- A 47.** 5 歲的小美因感染腸病毒而合併無菌性腦膜炎,有關無菌性腦膜炎的敘述,何者正確?(A)初步檢查會出現 Kernig's sign(+)、Brudzinski's sign(+)及頸背僵硬的情形(B)主要會出現頭圍異常增加、前囟門鼓凸、哭聲尖銳及噴射式嘔吐等症狀(C)由腰椎穿刺抽取腦脊液檢查呈現混濁、壓力增高及葡萄糖減少的結果(D)主要的醫護措施為投予抗生素10 天,提供退燒護理及補充體液及電解
- D 48.** 有關兒童顱內出血的敘述,下列何者錯誤?(A)顱內出血嚴重時會有意識改變,呈現昏迷、心跳停止、瞳孔放大,甚至死亡 (B)兒童顱內出血的後遺症包括腦性麻痺、肢體偏癱、視力受損、動作發展遲緩等 (C)若將嬰兒拋向空中,可能會造成其硬腦膜下腔出血 (D)嬰兒搖晃症候群的顱內出血,主要為顱骨骨膜下出血。
- A 49.** 下列何者不是兒童重度燒傷的定義?(A)燒傷兒童年齡在5 歲以上 (B)全皮層燒傷面積超過全身體表面積10% (C)燒傷範圍包括臉、手、腳及會陰部 (D)有其他合併的損傷同時發生。
- A 50.** 有關兒童「慢性病」的定義,下列何者正確?(A)日常功能受影響的時間每年至少3 個月 (B)日常功能受影響的時間每年至少6 個月 (C)住院時間每年至少4 個月 (D)住院時間每年至少6 個月
- C 51.** 有關腸套疊(intussusception)之敘述,下列何者錯誤?(A)好發於3~12 個月的嬰兒 (B)嘔吐物中含有膽汁,且解草莓色果醬般大便 (C)病童出現發燒、壓痛、便血等症狀時,需以鉭劑灌腸推回套入的迴腸 (D)病童之脈搏、呼吸加快、血壓下降,且有腹脹等徵象時,需立即手術治療。
- D 52.** 有關氣喘兒童治療之敘述,下列何者錯誤?(A)可於運動前先吸入 cromolyn sodium (intal, MDI 型)以預防運動期間氣喘發作(B)使用 aminophylline 時,要觀察是否有心律不整現象(C)平日除了藥物控制外,可用減敏療法來治療氣喘 (D)支氣管擴張劑為可真正解決氣喘根本病因之藥物
- C 53.** 陳小弟5 歲,接受扁桃腺切除手術,下列敘述何者正確?(A)術後1 週內持續的輕微發燒是正常現象 (B)鼓勵兒童深呼吸及咳嗽,以排除痰液(C)術後2 週內暫時不要游泳(D)避免吃冰涼的流質食物
- B 54.** 「4D」是會厭炎(epiglottitis)臨床主要的四大表徵,而下列何者不屬於「4D」之表徵?(A)發音困難(dysphonia) (B)言語困難(dysphasia) (C)吞嚥困難(dysphagia) (D)流口水(drooling)
- C 55.** 李小弟今年2 歲,因中耳炎住院,進行鼓膜切開引流術,下列指導何者正確?(A)為避免壓迫,鼓勵李小弟臥向健側 (B)盡量側臥餵食牛奶 (C)避免淋浴或洗頭的汗水流進耳內 (D)幫李小弟清外耳道時,耳朵要向上向後拉。
- B 56.** 有關巨結腸症(congenital agarglionic megacolon)之敘述,下列何者錯誤?(A)男孩比女孩易罹患此疾病 (B)在巨結腸的部位缺乏交感神經細胞 (C)新生兒出生24 小時後仍未解胎便,且肛診時直腸內空無一物 (D)最常見的部位為乙狀結腸。
- A 57.** 依據 101 年 8 月 8 日修正的兒童及少年福利與權益保障法,當護理師知悉兒童施用毒品時,應於幾小時內向主管機關通報?(A)24 (B)48 (C)72 (D)96。
- D 58.** 小明,5 歲,因上呼吸道感染住院,基於以家庭為中心的照護理念,下列何者錯誤?(A)鼓勵病童其家庭成員,表達對病童罹病的想法 (B)需要時評估病童家人,不能參與照顧病童的原因 (C)教導父母,共同參與病童所需的照護知識及技巧 (D)為賦權父母照顧能力,要求須在院執行病童的照護
- D 59.** 小馨,20 個月,身體檢查評估時,一般而言,下列那顆乳齒尚未長出?(A)犬齒(B)側門齒(C)第一大白齒(D)第二大白齒
- A 60.** 下列何者是嬰兒自我撫慰行為的表徵?(A)嬰兒哭泣時,能藉由將手指放進嘴裡而安靜下來 (B)嬰兒凝視著布娃娃,能眨眼打哈欠 (C)安靜時,嬰兒能轉頭面向呼喚他的照顧者 (D)餓了能大聲哭泣。
- A 61.** 依據皮亞傑認知發展學說,兒童於下列那一期開始建立物體恆存的概念?(A)感覺運動期(sensory-motor stage) (B)運思前期(preoperational stage) (C)具體運思期(concrete operational stage) (D)形式運思期(formal operational stage)。
- B 62.** 小燕,12 個月大,至健兒門診接受健康檢查,小燕應可以通過下列那一項丹佛 II 發展測驗?(A)可以說出雙字句且正確運用連接詞 (B)懂得用拇指和食指拿葡萄乾 (C)可以將瓶子內的小東西倒出來 (D)可以依問話指出自己的五官。
- C 63.** 有關嬰幼兒氣質評估之敘述,下列何者錯誤?(A)氣質評估可協助家長建立親子關係 (B)嬰幼兒的氣質型態可作為因材施教的依據 (C)氣質評估可以預估兒童未來的智力發展 (D)氣質是嬰幼兒先天對內外刺激的反應方式。

- C 64.** 有關初乳的優點，下列敘述何者錯誤？(A)初乳有豐富的免疫活細胞、抗體及其它保護蛋白，可以預防多種感染，同時增進嬰兒自體免疫系統的發育 (B)初乳可幫助嬰兒腸道的成熟與健全功能，讓微生物及過敏原不容易進入嬰兒體內 (C)初乳富含維生素D，有助於骨骼發展及減少感染 (D)初乳有助胎便排出，促進膽紅素排出，減少黃疸的嚴重性。
- C 65.** 有關嬰幼兒腸胃道生理功能之敘述，下列何者正確？(A)嬰幼兒的胃容量小、胃排空時間短、腸蠕動速度緩慢，故飲食需要少量多餐(B)新生兒於出生24小時後，會因腸蠕動及胃結腸反射，解出墨綠色黏稠的胎便(C)新生兒腸道的長度約為身長的10倍，腹瀉會流失較多的體液及電解質(D)嬰兒因澱粉酶、脂肪酶、胰蛋白酶不足，而增加腹脹與腹瀉機會
- D 66.** 有關嬰幼兒腸胃道生理功能之敘述，下列何者正確？(A)嬰幼兒的胃容量小、胃排空時間短、腸蠕動速度緩慢，故飲食需要少量多餐(B)新生兒於出生24小時後，會因腸蠕動及胃結腸反射，解出墨綠色黏稠的胎便(C)新生兒腸道的長度約為身長的10倍，腹瀉會流失較多的體液及電解質(D)嬰兒因澱粉酶、脂肪酶、胰蛋白酶不足，而增加腹脹與腹瀉機會
- B 67.** 新貝拉德計分法 (New Ballard Score) 新生兒神經肌肉成熟度的評估結果，下列何者的成熟度分數最高？(A)平躺時四肢呈現伸展狀態 (B)方形窗角度為「0」度 (C)膝關節角度為「160」度 (D)手肘可被拉超過身體中線。
- D 68.** 有關新生兒立即護理之敘述，下列何者正確？(A)出生後評估阿帕嘉計分若高於7分，僅評估一次即可 (B)勿用含碘消毒液，避免影響新生兒苯酮尿症篩檢的結果 (C)為預防梅毒感染，應點四環黴素之抗生素眼膏 (D)施打維生素K1，目的是預防新生兒出血。
- D 69.** 朱女士要出院了，詢問新生兒沐浴的相關事項，下列回答何者不適當？(A)「為避免吐奶，先洗澡再餵奶比較恰當」(B)「要經常幫新生兒洗頭髮，以避免頭皮上鱗屑的形成」(C)「要控制環境的溫度，維持新生兒體溫是很重要的」(D)「新生兒沐浴應先洗頭髮再洗臉部，最後洗軀幹」。
- A 70.** 有關胎頭變形 (molding) 的敘述，下列何者正確？(A)生產時，胎頭受壓致使頭骨出現重疊不對稱的現象 (B)生產時，胎頭受壓致使頭骨軟組織腫起來的現象 (C)生產時，胎頭受壓致使頭骨表面與骨膜間血管破裂的現象 (D)生產時，胎頭受壓致使頭骨受損，發育變形的現象。
- B 71.** 楊小妹，妊娠週數39週又5天出生，體重3980公克，自然產，產鉗使用，下列何者是左側顏面神經麻痺之徵象？(A)哭時左臉扭曲，嘴角下垂 (B)左眼無法閉合，口角流涎 (C)右臉活動消失 (D)右側無抬眉動作。
- C 72.** 有關新生兒尿布疹之護理措施，下列何者錯誤？(A)勤於檢查尿布，如有潮濕應立即更換 (B)新生兒排便後應以清水清洗臀部 (C)距離臀部約25~30公分使用烤燈 (D)擦氧化鋅藥膏減少患部滲液，以保持臀部乾燥。
- D 73.** 有關核黃疸初期的臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)嗜睡、肌肉張力差 (B)無驚嚇反射 (C)無吸吮反射 (D)角弓反張、高音調哭泣。
- B 74.** 黃小妹，出生48小時即全身黃疸，膽紅素值12 mg/dl，檢驗結果顯示為血型不合造成之溶血性黃疸，有關這種病理性黃疸的原因，下列敘述何者正確？(A)母親的血型是A型，胎兒的血型是O型 (B)母親的血型是O型，胎兒的血型是A或B型 (C)母親的血型是AB型，胎兒的血型是O型 (D)母親為Rh(+)，胎兒為Rh(-)。
- D 75.** 有關膽道閉鎖 (biliary atresia) 的臨床表徵，下列何者錯誤？(A)解灰白色大便 (B)尿液呈暗茶色 (C)肝脾腫大 (D)心智障礙。
- A 76.** 小明，3歲大，因罹患心室中隔缺損，入院行開心手術，術後住進小兒加護病房，手術後第1天，小明在床上哭泣喊著要媽媽，且拒絕護理師的安撫，此種行為反應是屬於分離焦慮的那一期？(A)抗議期 (B)否認期 (C)失望期 (D)去依戀期。
- A 77.** 王小弟，2個月大，接受腹部手術，下列敘述何者為手術後第1天進行疼痛評估的指標？(A)臉部扭曲、皺眉 (B)保護疼痛部位 (C)將疼痛刺激推開 (D)咬緊牙關、握緊拳頭。
- D 78.** 下列何項不是治療性遊戲 (Therapeutic play) 的目的？(A)宣洩情緒 (B)提供治療相關訊息 (C)了解病童的感受 (D)分析早期經驗對病童的影響。
- C 79.** 下列關於使用耳鏡視診兒童耳朵的敘述，何者正確？(A)不應將耳鏡插入耳道，宜以鏡孔光線照射耳道仔細觀察 (B)3歲以下的孩童，需將其耳廓頂端向上向後拉 (C)正常沒有感染的鼓膜，呈現透明或珍珠色 (D)當耳膜破裂有耳漏時，無法看到耳膜破裂的裂孔。
- C 80.** 有關嬰兒及兒童接受氧氣治療之相關敘述，下列何者正確？(A)使用鼻套管時，氧氣流量不可超過2 L/min，以免黏膜乾燥 (B)使用氧氣面罩時，氧氣流量不可超過6 L/min，以免氧氣濃度過高 (C)使用氧氣頭罩時，氧氣流量約調為5 L/min，以免二氧化碳滯留 (D)使用氧氣帳時，氧氣流量約調為3 L/min，以免發生火花