

# 崇仁醫護管理專科學校 105 級護理師執照考

## <第 1 次模擬競試>

科目：精神科與社區衛生護理學（共 5 頁）班級： 姓名： 學號：

一、選擇題：每題 1.25 分，總分 100%

- C** 1. 丁先生一聽到氣象播報員發布寒流來襲，山區有豪大雨請民眾慎防土石流.....的相關訊息後，呈現肢體肌肉僵硬、暈眩、噁心、呼吸急促、焦躁，無法再處理後續的庶務性工作如次日旅遊行程之安排。請問丁先生目前屬於何種狀態?(A)輕度焦慮(B)中度焦慮(C)重度焦慮(D)恐慌
- D** 2. 郭軫身體健康，但在公眾場合會有心悸、噁心及小便困難等症狀，各項理學及實驗室檢查結果均正常，其較有可能之診斷為何?①慮病症(hypochondriasis) ②焦慮症(anxiety disorder) ③轉化症(conversion disorder) ④恐懼症(phobic disorder) (A)①③ (B)②③ (C)①② (D)②④
- A** 3. 下列何者是「人格疾患」(personality disorder)中「反社會人格」(antisocial personality)者之行為特徵?(A)欺騙、操控、缺乏罪惡感、不遵從規範 (B)誇大、自我膨脹、優越感、自行其事 (C)行為僵化、不會變通、常責怪他人 (D)害怕分離、獨立與做決定、常反覆不定
- C** 4. 有關佛洛伊德(Freud)人格結構論之敘述，下列何者正確?①原我為享樂原則，多於前意識(pre-conscious)運作②自我多於意識層面運作，主要是平衡原我與超我③超我是人格發展中最後一個發展的④自我功能愈薄弱，則個體的自我控制力愈差(A)①②③ (B)①②④ (C)②③④ (D)①③④
- B** 5. 有關delirium與dementia之區辨，何者正確?(A)dementia發作緩慢，但病程進展波動大 (B)delirium個案常見視幻覺症狀(C)dementia個案先發生遠期記憶力障礙(D)delirium好發於65歲以上老人
- B** 6. 阿茲海默氏失智症的描述，何者最不適當?  
(A)早期出現的症狀，包括記憶力減退，且影響到日常生活 (B)其病程的進展是可逆的 (C)個案記憶力減退的順序，由立即記憶、近期記憶到遠期記憶(D)個案在傍晚之後，會出現日落症候群。
- 情況:李老太太因股骨骨折而入院，進行手術治療多日，因行動不便，多臥床且進食量少。護士注意到原本意識清楚的李老太太，最近病情轉變，意識有時混亂有時清醒，專注力差。一日她神情緊張的對護士說，她看到已過世的老伴站在床尾對她笑。不一會兒，她又抬起手，在空中搖擺好像在與某人說再見。
- A** 7. 李老太太可能具有以下何種症狀?(A)譫妄 (B)憂鬱 (C)新語症 (D)作態症。
- C** 8. 有關譫妄(delirium)之敘述，下列何者錯誤?  
(A)譫妄多見於酒精戒斷病患 (B)譫妄多見於器質性腦病變者  
(C)長期暴露於大量的含鋁環境，可能導致譫妄 (D)若能針對病因治療，譫妄通常是可逆性的。
- D** 9. 有關酒精生理作用的敘述，下列何者錯誤?(A)全身性戒斷症狀，包括震顫、躁動、幻覺、抽搐、譫妄 (B)常導致幻覺、妄想及有蟲爬行的感覺 (C)長期使用會因維生素缺乏，造成Wernicke's腦病變 (D)飲用劑量達血中濃度0.05g/dL，即會出現嚴重的呼吸抑制，甚至導致死亡。
- A** 10. 林小弟5歲，在家出現撞擊頭部、抓頭髮、咬指甲等自我傷害行為，醫師診斷為自閉症，護理人員應教導家屬當時如何處理?①安排結構性活動，讓病童有固定常規可依循 ②自傷行為出現時，必要時可使用護具、護墊予以保護 ③強調傾聽 ④協助兒童了解自我與他人的不同。  
(A)①② (B)③④ (C)①③ (D)②④。
- B** 11. 劉小姐在行為治療過程中表示：「我不要做了，為什麼都要聽你們的?」，劉小姐為何種反應?  
(A)焦慮 (B)阻抗行為 (C)退化行為 (D)無助。
- B** 12. 團體治療進行過程中，有二位成員因彼此意見不合而發生爭執，執致其中一位成員憤而離開團體，此時團體中瀰漫著一般不安的氣氛，治療者採取之處置，下列何者最適宜?(A)延續之前討論的主題 (B)鼓勵成員表達此時的感受 (C)再度強調團體的規範 (D)暫停團體以調節衝突事件。
- A** 13. 對酒癮匿名團體(Alcoholic anonymous;AA)敘述可著錯誤?(A)無法有效讓成員拒絕飲酒的誘惑 (B)病人可發現每位成員都有不同的問題，並非只有自己有酗酒的問題 (C)治療者帶領成員進行角色扮演等治療活動，引導成員拒絕飲酒的誘惑 (D)可以透過團體中成員的分享及討論，以有效因應對酒精的渴求。
- A** 14. 關於嫌惡治療的敘述，下列何者錯誤?(A)以美沙冬(methadone)替代酒精 (B)常用於想要戒酒的病患 (C)原理是使用負向刺激消除不良行為 (D)需要病患配合方可執行。

- C** 15. 劉小姐接受社區復健服務時，護理師須掌握的復健原則，下列敘述何者正確？(A)僅有少數的個案具有改變的潛力 (B)照顧的核心是減輕症狀 (C)促使個案能主動參與照顧計畫 (D)建立病人的病識感是復健之重點。
- C** 16. 下列何者屬於初級預防的工作範疇？(A)提供照護資訊給自閉症兒童的父母 (B)輔導職能復健 (C)提供社區住戶壓力管理之相關資訊 (D)自殺防範。
- A** 17. 有關精神病人的權利，下列敘述何者正確？(A)精神病人有權拒絕會談時錄音、錄影 (B)給予臨時情緒躁動的精神病人約束措施前，為了預防病人反抗，不需得到病人的知情同意 (C)慢性精神病患應置於慢性療養機構，避免回歸住家生活的社區，保障社區居民居住正義 (D)精神病人有權留在精神科醫院接受長期的住院。
- A** 18. 19歲林小姐，準備大學學測，因擔心學測結果未達媽媽的期待，常感焦慮不安。學測當日第一節考試時，發現自己的手無力而無法握筆寫字，此為下列何種防衛機轉所致？(A)轉化作用 (conversion) (B)內射作用 (introjection) (C)解離作用 (dissociation) (D)象徵作用 (symbolization)。

情況：陳小姐，近日購買200萬名牌包且翹家，認為自己有超能力，由母親聯繫將他送醫，診斷為躁症的病人，護理人員在與其會談時，首先談到家人關係時，陳小姐說：「討厭家人，最恨媽媽，最愛我的狗狗，昨天中午隔壁床的病患在大叫，什麼事要叫那麼大聲，天天都吃泡麵很煩……」。請依此回答以下四題。

- D** 19. 陳小姐的症狀最符合下列何者？(A)新語症 (B)說話繞圈 (C)音韻連結 (D)意念飛躍。
- A** 20. 對於陳小姐做的「羅夏氏測驗」，是屬於：  
(A)投射測驗 (B)整體認知功能 (C)智力測驗 (D)知覺及性格測驗。
- D** 21. 某日陳小姐手握拳頭、提高音量站在醫務室前，對著裡面的護理人員威脅說：「若不讓我出院，就要攻擊你們！」此時應：(A)將醫務室的門鎖好，不要反應，靜待氣氛平息 (B)透過對話窗口告訴病人，若不控制情緒就要關保護室 (C)動員足夠人力，立刻將病人送入保護室 (D)走出醫務室，與病人保持側身一個手臂的距離，了解病人的氣憤。
- B** 22. 陳小姐症狀改善後，護理師為控制其情緒，應注意維持鋰鹽血中濃度在下列何範圍內？(A)0.2~0.5 mEq/L (B)0.6~1.0 mEq/L (C)1.0~1.4 mEq/L (D)1.5~2.0 mEq/L。
- C** 23. 王先生因出現腹瀉與脹氣，懷疑自己罹患大腸癌，經多次生理檢查皆正常，但他仍深信自己不久人世，之後變得無食慾、失眠，有輕生念頭。宜優先採取下列何種護理措施？(A)再做詳盡健康檢查，降低憂鬱 (B)教導紓解壓力的方法 (C)評估自殺的風險程度 (D)鼓勵寫遺囑，降低焦慮。
- B** 24. 當思覺失調症患者出現妄想時，下列敘述何者正確？(A)要求病人學習與妄想相處 (B)執行環境安檢以維持病房之安全 (C)減少驗證事實的能力 (D)妄想內容要逐一駁斥，以免患者堅信不疑。
- A** 25. 有關思覺失調症病因的敘述，下列何者最正確？(A)由於多巴胺 (dopamine) 濃度過高或過度被活化所致 (B)與乙醯膽鹼 (acetylcholine) 過高有關 (C)與乙醛脫氫酶 (aldehyde dehydrogenase; ALDH) 過高有關 (D)神經生化學研究顯示正性症狀與血清素 (5-HT) 有關。
- D** 26. 護理人員衛教服用 benzodiazepines (BZDs) 的老年人及家屬時，下列注意事項何者正確？(A)不會造成生理依賴 (B)老年人應使用長效型 (C)停藥時需立即停止 (D)服藥後肌肉易放鬆，需預防跌倒。
- A** 27. 下列有關錐體外徑症候群 (extrapyramidal syndrome; EPS) 的敘述，何者最正確？(A)表情呆板、吞嚥困難是類巴金森氏症狀，通常在服藥後 3 個月發生 (B)流口水、手抖是遲發性運動不能 (tardive dyskinesia) 症狀，通常在服藥初期發生 (C)發生急性肌肉緊張異常 (acute dystonia)，病人須停藥改為第二代抗精神病藥物 (D)靜坐不能 (akathisia)，例如來回走動多發生於開始用藥後 4~5 天內。

情況：方小弟，18歲，因刷爆數張信用卡、翹家與拒學，認為自己有超能力，由母親聯繫警察將他送醫。經醫師診斷為躁症，建議住院治療，但父親認為方小弟沒病，母親對其住院感到矛盾與自責。請回答以下三題。

- D** 28. 方小弟到急性病房看到門鎖，大叫「我不要住院，我要回家」，此時雙親更猶豫是否要住院。護理人員應當如何處理？(A)將個案四肢約束，防範逃跑 (B)哄騙個案，只是參觀病房 (C)請求雙親幫忙安撫勸說個案 (D)向個案與雙親強調環境與住院意義。
- A** 29. 方小弟住院中因激動摔椅子，被帶入保護室。此時護理人員應如何處置較恰當？(A)向個案解釋此處置的原因 (B)明確斥責不當的行為 (C)請個案在保護室內反省 (D)嚇阻個案，避免行為再犯。

- C 30.** 方小弟住院 4 週情緒已較穩定，將於 5 天後出院。此階段護理重點為下列何者？(A)建立治療性人際關係 (B)專業團隊的評估與測驗 (C)建立服藥與疾病的認知 (D)安排活動，引導精力宣洩。
- A 31.** 照護一位重度憂鬱的病患，護理師應當扮演何種角色？(A)評估其生理與情緒的狀況 (B)培養獨立自主，增加自信心 (C)協助其檢視固著的思考模式 (D)規定參加社團，增加人際互動技巧。
- B 32.** 李小姐在家中企圖割腕自殺。家人發現後送急診室，到急診室後李小姐未再提起自殺。下列措施何項正確？(A)不主動與其討論自殺，以免引發自殺的想法 (B)主動關心與其自殺有關的事件及感受 (C)保持沉默，很可能李小姐正對此事後悔 (D)認知功能測驗後再決定是否和其討論自殺事件。
- D 33.** 面對一位處於中度焦慮的病人，下列護理措施何者最適當？①滿足其獨立性需求②約束病人以維護安全③評值及學習適當的因應技巧④傾聽同理以協助減輕焦慮  
(A)①③ (B)②③ (C)①② (D)③④。
- C 34.** 何小姐常出現重複洗手的行為，自覺摸過掃把後，手上沾滿無數的細菌，必需重複洗手，甚至洗到手破皮才願意停止，請問何小姐最有可能罹患下列哪一種精神疾病？(A)廣泛性焦慮症 (B)慮病症 (C)強迫症 (D)恐慌症。
- D 35.** 思覺失調症者，出現規則重複某固定型態的動作或語言，但不具任何意義，如不斷繞著椅子打轉，要求停止也難以停止，是屬於：(A)蠟樣屈曲 (B)回音性動作 (C)阻抗行為 (D)刻板動作。
- D 36.** 有關幻覺的敘述，下列何者錯誤？(A)幻覺產生的原因包括器質性與非器質性 (B)幻覺可能是個人內在經驗投射到外在世界的現象 (C)幻覺對當事人而言，是真實的 (D)藥物能將幻覺完全治療。
- C 37.** 當王小姐在病房中聽到批評聲音，認為是某病友要害她而出現暴力攻擊行為時，下列處理何者適宜？①告知醫師評估是否需約束 ②疏散周圍其他圍觀病患 ③為搶第一時間處置，在其他人未到前，趕快獨自前往處理 ④約束時，向其解釋約束是為了幫助控制焦慮及衝動。  
(A) ②③④ (B) ①②③ (C) ①②④ (D) ①③④。
- A 38.** 溫小姐為日間病房思覺失調症個案，某日下課後遭路人強暴，被棄置於暗巷，個案晚歸後遭母親叨念，自此出現失神發呆現象，2 天後跳海，被遊客救回，轉往急性精神病房住院，下列有關護理照護的敘述何者正確？(A)針對溫小姐的最重要護理措施是保護病患，並避免其做出更進一步的傷害行為 (B)護理師短期內應每一小時觀察溫小姐的行蹤及情緒反應，並避免讓個案有獨處的機會 (C)溫小姐的自殺行為反應了內外資源的缺乏，但護理師應針對個案關懷，無需與家庭溝通 (D)有關溫小姐的自殺行為不容易引發自覺，其護理行為較無法從自殺評估因子中進行掌控。
- A 39.** 有關危機 (crisis) 的敘述，下列何者正確？①危機是一種精神疾病 ②是個人處於不平衡狀態 ③是一段過渡期，超越個人應付能力 ④正確處置的結果可能提升個人能力。  
(A) ② ③ ④ (B) ① ② ③ (C) ① ② ④ (D) ① ③ ④
- A 40.** 陳小姐，38 歲，診斷為憂鬱症，服用大量安眠藥企圖自殺，被家屬發現後送醫治療，今日欲出院，有關護理師對家屬的衛教，下列何者正確？(A)出院後仍要預防自殺，因為憂鬱症恢復期自殺的危險性更大 (B)當陳小姐的情緒狀態好轉時，其自殺威脅性便會消失 (C)憂鬱症自殺是一種手段，所以陳小姐的自殺只是要尋求家人關心 (D)有自殺經驗的個案通常都不會再自殺。
- D 41.** 社區衛生護理師扮演的代言人 (advocate) 角色，下列敘述何者最適當？(A) 進入案家並盡力促使案家進行適度的改變 (B)與團隊共同合作解決案家健康問題 (C)依個別需要及特質以適合方式予護理指導 (D)於適當時機傳達案家的健康需求。
- D 42.** 有關國內接受免費乳癌篩檢之資格及頻率的敘述，下列何者正確？(A)40~44 歲其二親等內血親曾患有乳癌之女性每年 1 次，其他 40 歲以上者每 2 年 1 次乳房 X 光攝影檢查 (B) 45~69 歲婦女，每 2 年 1 次乳房超音波檢查 (C)30 歲以上婦女，每 3 年接受 1 次乳房超音波檢查 (D) 40~44 歲其二親等內血親曾患有乳癌之女性或 45~69 歲者，每 2 年 1 次乳房 X 光攝影檢查。
- B 43.** 某社區 6000 人，15~49 歲婦女 2000 人，該年出生嬰兒有 50 人，其中活嬰 30 人，請問該社區一般生育率為百分之多少？(A)20‰ (B)15‰ (C)30‰ (D)55‰。
- C 44.** 某地區年中人口數為 10 萬人，該地區肝癌病患為 1,000 人，全年內死亡總人數為 1000 人，其中因肝癌死亡為 50 人，該地區肝癌致死率為何？(A)3% (B)30% (C)5% (D)50%。
- B 45.** 與前瞻性世代研究相較，下列何者為病例對照研究法的缺點？(A)暴露資料的時序不易掌握 (B)資料收集易發生回憶偏差 (C)追蹤對象容易流失 (D)因果關係判別較不明確。
- B 46.** 某社區進行 500 名子宮頸抹片篩檢，發現有 50 名婦女是零期子宮頸癌病人，經診斷後確認 40 名為陽性，而原本 450 名健康者診斷後有 420 名為陰性，請問此次篩檢的特異度為何？(A) 80% (B)93.3% (C) 84% (D) 90%。

- C 47.** 某縣教育局與衛生局共同針對縣內國中、高中學校全體師生，嚴格規範要求師生騎或乘坐機車戴安全帽，以減少事故傷害，此措施是預防概念中的哪一項？  
(A) 限制殘障 (B) 健康促進 (C) 特殊保護 (D) 早期診斷早期治療。
- A 48.** 根據Pender的健康促進模式影響個體預防性健康行為，主要包括哪些？①人特質與經驗 ②行為特異性的認知與情感 ③行為結果 ④政策與法規：(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④。
- B 49.** 依據PRECEDE-PROCEED模式，社區進行整合性篩檢服務時，常會考慮民眾接受服務之可近性，此因素是屬於：(A)素質因素 (predisposing factors) (B)促成因素 (enabling factors) (C)增強因素 (reinforcing factors) (D) 政策因素 (regulatory factors)。
- B 50.** 王先生已經規律運動7個月，最近常覺得懶懶的不太想動。如果要讓王先生能持續維持運動，依據階段改變理論可以善用下列何種策略？(A)意識覺醒 (B)增強管理 (C)環境再評價 (D)情感喚起
- D 51.** 促進社區民眾參與中老年人「健康100腰動動」健康促進計畫，下列何者策略最適當(A)組織對計畫友善的人，充分授權規劃喜愛的策略 (B)以行政單位的成員為推動主力，較容易成功 (C)確認領導者關心健康的議題，修改計畫策略 (D)策略須考量中老年人的特性，提供其適當且有效的活動
- D 52.** 應用流行病學方法判定因果關係時，哪一項是必要條件，否則無法成立？(A)劑量效應 (dose-response effect) (B)相關的一致性 (uniformity of association) (C)符合現存的生物知識 (biological plausibility) (D)正確的時序性 (temporality of association)。
- D 53.** 某社區正流行登革熱，在4月1日調查1,000人，其中有100人證實已被感染到登革熱，在6月1日調查同一群人口，又另確認出100人感染到登革熱，有關此社區的登革熱流行狀況，下列何者正確？  
(A) 點盛行率為20% (B)累積盛行率為20%(C)累積發生率為10% (D)期盛行率為20%
- C 54.** 有關新型A型流感之描述，下列何者正確？①H1N1、H3N2屬於每年週期性流行的流感②致死率約為80~90%③常見於禽鳥病毒傳染人類，如：H7N9、H5N1④密切接觸者須自主健康管理5天⑤發現個案須於48小時內通報(A)①② (B)②④ (C)①③ (D)④⑤
- D 55.** 有關多重抗藥性結核病(MDR-TB)的描述，下列何者正確？①結核菌培養為陰性，對任何fluoroquinolone藥物有抗藥性者 ②結核菌培養為陽性，且同時對於isoniazid與rifampin有抗藥性③因為藥物副作用以致症狀無法明顯改善④進階都治計畫(DOTs Plus)能更全面監控多重抗藥性結核病人：(A)①② (B)②③ (C) ①④ (D) ②④。
- C 56.** 社區衛生護理人員對於由新冠狀肺炎疫區入境的民眾，採取居家檢疫14天，是屬於三段五級的哪一級預防工作？(A)第一級預防 (B)第二級預防 (C)第三級預防 (D)第四級預防
- A 57.** 社區護理師為提升懷孕新住民的健康識能(health literacy)，下列何者較不適當？(A)舉辦各種國家傳統服飾表演 (B)鼓勵參加國小國語班學習中文 (C)鼓勵參加新住民媽媽教室 (D)提供雙語的媽媽健康手冊。
- B 58.** 目前全民健保所提供的免費產前檢查項目，下列何者正確？(A)德國麻疹抗體陰性孕婦免費注射疫苗 (B)每胎1次免費超音波檢查 (C)免費產前檢查時間為妊娠第一期1次、妊娠第二期3次、妊娠第三期6次 (D)於妊娠第二期補助1次孕婦乙型鏈球菌篩檢。
- D 59.** 社區衛生護理師在教導民眾預防慢性腎臟病的方法，下列何者正確？(A)減少飲水量，以避免對腎臟的負荷 (B)儘量採用低蛋白飲食，以減少對腎臟的負荷 (C)按時服用藥物改善腎臟功能 (D)定期接受血壓、血糖、肌肝酸與蛋白尿的檢查。
- A 60.** 有關骨質疏鬆症的敘述，下列何者錯誤？(A)男性罹患率較女性高 (B)腕部或脊椎的雙能量X光骨密度檢查(DEXA)是目前的診斷依據 (C)負重運動可以改善骨質疏鬆 (D)骨密度T值小於-2.5。
- D 61.** 有關長期照顧十年計畫2.0的服務對象之敘述，下列何者最不適當？(A)48歲左側偏癱郭小姐，工具性日常生活活動功能失能 (B)65歲王先生，巴氏量表(Barthel ADL Index)無失能，但有工具性日常生活活動功能失能，且經SOF評估三項指標中有二項 (C)65歲李奶奶，巴氏量表(Barthel ADL Index)小於60分 (D)80歲獨居陳先生，日常生活活動功能滿分。
- A 62.** 李太太產後三個月，嬰兒診斷出「黏多醣儲積症」，希望有機會了解類似狀況家庭照顧者的經驗，以增加其心理適應，社區衛生護理師可轉介她使用下列那一項服務？(A) 罕見疾病家屬支持團體 (B)居家護理 (C) 喘息服務 (D)居家服務。
- A 63.** 下列那個評估工具，可用以了解家庭遺傳性疾病及世代間的關係？  
(A)家系圖(genogram) (B)生態圖(eco-map) (C)家庭圈(family circle) (D)APGAR家庭功能評估。
- A 64.** 下列何者符合家族網(kin network)的特徵？(A) 未婚夫婦和孩子同住，這對夫婦無正式婚姻契約 (B)離婚或鰥寡的父母再婚後帶著彼此子女組成家庭 (C)具有共同監護權的家庭，孩子屬於兩個核心家庭 (D) 核心家庭或未婚者居住於附近，彼此交流物資及服務。

- A 65.** 在APGAR家庭功能評估表中，「家庭在發生問題或面臨困難的時候，家庭成員對於內在資源或外在資源的運用情形」是為了解何項家庭功能？(A)適應度(adaptation) (B)合作度(partnership) (C)融洽度(resolve) (D)領域度(boundaries)。
- B 66.** 下列何者屬於家庭的內在資源？①財力支持②文化資源③資訊④愛⑤結構的支持⑥環境資源：  
(A)①②③④ (B)①③④⑤ (C)①④⑤⑥ (D)②③④⑥。
- A 67.** 有關出院準備服務的描述，下列何者錯誤？(A)病情穩定確定出院時進行評估 (B)以個案為中心的轉銜機制 (C)可達到提供持續性照顧的目的 (D)利用高危險篩檢表找出需服務的個案。
- C 68.** 有關全球環境改變之敘述，下列何者錯誤？(A)大氣中二氧化碳是造成「溫室效應」的重要成分 (B)石化燃料產生硫氧化物、氮氧化物，與水滴相結合形成酸雨 (C)大氣中因臭氧濃度升高，造成紫外線更易穿越大氣層照射地表 (D)有害廢棄物的越境擴散為其現象之一。
- A 69.** 有關醫療廢棄物的處理，下列敘述何者為是？(A)不可燃的感染性廢棄物經滅菌處理後，可視為一般廢棄物清除 (B)放射性事業廢棄物應收集於白色塑膠袋交由原子能委員會處理 (C)可燃性的感染性事業廢棄物用紅色容器收集，不可燃的以綠色容器收集 (D)按廢棄物處理辦法規定，感染性廢棄物不可在常溫下貯存。
- C 70.** 瞭解登革熱危險等級時，地段護士以布氏指數為參考，該指數代表的意義是什麼？(A)該地每100戶住宅中，發現家中有登革熱病媒蚊幼蟲的戶數 (B)該地每100戶住宅中，發現家中有登革熱病媒蚊成蟲的戶數 (C)該地每100戶住宅中，發現有登革熱病媒蚊幼蟲陽性容器數 (D)該地每100戶住宅中，發現有登革熱病媒蚊成蟲陽性容器數。
- B 71.** 空氣污染物中的硫氧化物(SO<sub>x</sub>)對人體的危害主要是：(A)胎兒體重過輕 (B)氣喘及呼吸系統疾病 (C)消化系統 (D)中樞神經系統。
- C 72.** 社區評估時要了解社區民眾的互動方式，下列何種方法最適當？(A)收集戶政資料 (B)收集醫院就診資料 (C)舉辦社區座談會 (D)瀏覽地方史誌。
- D 73.** 根據某山地部落的社區評估中對45歲以上婦女抽菸、喝酒、嚼食檳榔習慣的資料，有35.5%表示有抽菸習慣、51.0%表示每週喝酒3次以上、有14.0%表示有嚼食檳榔習慣。在規劃年度衛教議題與活動時，針對社區婦女，下列何者是公衛護理人員應涵蓋的健康議題？①事故傷害②調節生育③骨質疏鬆④子宮頸抹片⑤癌症防治：(A)①②③④ (B)①②④⑤ (C)①②③⑤ (D)①③④⑤。
- D 74.** 對於社區中獨居高血壓老年個案進行定期家訪監測其疾病控制狀況，並聯絡鄰里關懷志工每日探視，是運用哪些社區護理工作的原則？①以促進健康為重點②鼓勵民眾自主③運用社區資源④以特殊群體為中心：(A)①② (B)①④ (C)②④ (D)③④。
- A 75.** 社區衛生護理人員在擬定社區健康照護計畫，主要是根據：  
(A)社區診斷 (B)社區資源 (C)民眾參與過程 (D)政策配合度。
- B 76.** 學校護士於3月初發現4位學童因麻疹發高燒而至保健中心休息，則他所採取的措施中，下列何項是不恰當的？(A)向衛生單位報告 (B)對全校尚未發病學生給予麻疹疫苗注射 (C)請患病同學回家休養，並於痊癒後再回校上課 (D)注意全校每日因病假缺席同學的病因。
- A 77.** 下列哪些為我國兒童重要的健康促進重點？①降低兒童肥胖②提升口腔衛生③兒童視力保健④傳染病防治：(A)①②③ (B)①②④ (C)①③④ (D)②③④。
- C 78.** 教導幼稚園小朋友如何洗手，最好的教學方法為何？(A)提供圖片展覽法 (B)提供小班級演講法 (C)提供示範與演練法 (D)上網收集有關正確洗手的錄影帶播放。
- B 79.** 評估因病請假員工的健康狀況及所需工作職務的改變，以確定其合適的職位，預防更進一步的疾病傷害，為下列何者？(A)職前評估 (B)復職評估 (C)離職評估 (D)健康監控。
- C 80.** 下列何種現象可以用來鑑別是否為職業性氣喘？(A)家人亦有此症狀 (B)接受治療即可改善 (C)離開工作場所數天後，症狀即有改善 (D)無法根治。