

崇仁醫護管理專科學校 106 級護理師執照考

<第二次模擬競試>

科目： 護理學（共 頁） 班級： 姓名： 學號：

一、選擇題：每題 1.25 分，總分 100%

- (A)1. 關於內分泌腺體分泌荷爾蒙的敘述，下列何者正確？(A)留鹽激素是由腎上腺的皮質所分泌 (B)黃體生成素是由腦下垂體後葉所分泌(C)胰島素由胰臟的 γ 細胞所分泌(D)腎上腺素可使血糖下降
- (A)2. 有關內分泌功能障礙常見之生命徵象變化，下列何者正確？
(A)甲狀腺功能亢進時，體溫偏高 (B)糖尿病酮酸中毒時，呼吸深而慢)
(C)抗利尿荷爾蒙分泌過多，導致脫水 (D)腎上腺素分泌增加時，引起低血壓。
- (A)3. 生產時併發出血和低血壓，導致腦下垂體壞死，這稱為什麼症候群？
(A)席漢氏症候群 (Sheehan's syndrome) (B)西蒙氏症 (Simmond's disease)
(C)康氏症候群 (Conn's syndrome) (D)庫欣氏症候群 (Cushing's syndrome)。
- (A)4. 有關蝶骨切除腦下垂體腫瘤的手術後護理處置，下列何者正確？
(A)不可用力擤鼻涕、打噴嚏、咳嗽、解便 (B)提醒 Cortisone 類藥物，必須於飯前服用
(C)指導手術後二個月後，切勿進行彎腰動作 (D)若出現多尿、劇渴，表示可能血糖上升
- (C)5. 有關康氏症候群 (Conn's syndrome) 的臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)呼吸抑制 (B)心律不整 (C)低血容積 (D)多尿、夜尿
- (D)6. 有關嗜鉻細胞瘤的敘述，下列何者錯誤？(A)因病人情緒激動導致腫瘤突然釋放大量兒茶酚胺所導致
(B)過量的腎上腺素與正腎上腺素會引起交感神經過度活動 (C)會出現 5P 症狀：心悸、盜汗、疼痛、臉色蒼白及高血壓 (D)可透過檢測病人血液當中的杏仁酸 (VMA) 含量確立診斷
- (B)7. 嗜鉻細胞瘤 (pheochromocytoma) 主要是發生在何處？
(A)腎上腺皮質 (B)腎上腺髓質 (C)甲狀腺 (D)腦下垂體後葉
- (A)8. 嗜鉻細胞瘤患者接受腎上腺切除術之術後護理措施，下列何者正確？(A)密切監測生命徵象、尿量及腸音 (B)疼痛時給與 morphine，以避免低血壓 (C)鼓勵患者攝取含咖啡因飲料，以避免嗜睡
(D)術後執行 Valsava 動作，以減輕咳嗽引起的疼痛。
- (A)9. 抗利尿激素分泌不當症候群之臨床表徵為：
(A)低血鈉症 (B)尿液滲透壓低於血漿滲透壓 (C)尿比重減少 (D)血中尿素及尿酸值升高
- (D)10. 有關抗利尿激素分泌不當症候群 (SIADH) 的護理措施，下列何者錯誤？
(A)應補充 3%NaCl 補充鈉離子 (B)監測體重變化，必要時給予利尿劑
(C)評估神經功能及意識程度之變化 (D)預防與高血鈉有關的潛在性傷害。
- (A)11. 有關抗利尿激素分泌不當症候群 (SIADH) 之臨床表徵，下列何者錯誤？(A)通常是由泌尿道疾病引發 (B)最常出現症狀是食慾不振 (C)血鈉濃度會 $< 135 \text{ mEq/L}$ (D)病人會出現低尿酸血症
- (B)12. 有關尿崩症之護理措施，下列何者正確？(A)尿崩症患者 CVP 值會高於正常 (B)水剝奪試驗(water deprivation test)可協助尿崩症的診斷(C)應補充鈣離子(D)應靜脈注射人工 ADH 類似物 (DDAVP)
- (C)13. 有關尿崩症病人之照護與處置，下列何者不適當？(A)禁止會利尿的飲料與食物
(B)使用 Pitressin 的個案，在抽藥前要將藥液搖均勻 (C)限制每日水分攝取量，可避免出現代償性體液調節作用 (D)需要密集監測生命徵象、每日體重變化、尿比重、電解質。
- (B)14. 下列有關黏液水腫 (myxedema) 之敘述，何者正確？
(A)生長激素 (GH) 分泌低下所造成 (B)發生於新生兒，則稱為呆小症 (cretinism)
(C)出現凹陷性水腫(pitting edema)及腹瀉、腹脹 (D)對冷熱敏感，體重增加，深部肌腱反射增強
- (A)15. 有關甲狀腺功能低下症之護理措施，下列何者正確？
(A)甲狀腺素製劑需終身服用，不可自行停藥或更改劑量 (B)攝取高熱量食物，以維持體重
(C)甲狀腺素製劑須從大劑量開始 (D)服用甲狀腺素製劑會使血糖下降，糖尿病病人需監測血糖。
- (B)16. 有關甲狀腺功能低下症之護理措施，下列何者正確？
(A)服用甲狀腺素時採飯後使用，以避免胃酸增加 (B)使用甲狀腺素藥物時須監測血糖之變化
(C)給予病人電毯或熱水袋，以增加舒適及保暖(D)鼓勵採高熱量、低纖維、低脂肪飲食
- (B)17. 有關黏液水腫昏迷之檢查結果，下列何者錯誤？
(A)血清中 T4 下降 (B)血中 TSH 下降 (C)血鈉下降 (D)血糖下降
- (D)18. 下列何者是甲狀腺切除術後可能發生的合併症？①出血 ②低血壓 ③深部肌腱反射減弱
④甲狀腺風暴 ⑤喉返神經受損。(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)①④⑤

- (C)19. 有關以抗甲狀腺藥物治療甲狀腺機能亢進之敘述，下列何者正確？(A)先給予小劑量，再逐漸加量 (B)血清 T3 和 T4 值恢復正常就須完全停藥 (C)第一次給藥前，應先測量白血球與血小板數目 (D)作用機轉是影響已存在體內的甲狀腺素，使症狀消失
- (A)20. 狀腺風暴病患不可服用下列何種藥物，以防增加血液中游離的甲狀腺素？
(A)Aspirin (B)Acetaminophen (C)Digoxin (D)Propranolol
- (C)21. 有關使用抗甲狀腺硫醯胺類 (thionamides) 藥物之敘述，下列何者正確？
(A)一般先用小劑量開始，穩定後再逐漸減量 (B)症狀消失後即可停藥
(C)通常效果須等 2~3 個週後才顯現出來 (D)副作用易導致顆粒性白血球增多。
- (D)22. 有關甲狀腺風暴病人之護理措施，下列何者錯誤？(A)評估病人是否出現發燒、心跳過速、脫水及躁不安之徵象 (B)靜脈注射補充生理食鹽水及維生素 B1 (C)給予 β -腎上腺素阻斷劑，以降低心搏速率 (D)因甲狀腺激素分泌亢進所致，可給予 levothyroxine 類藥物治療。
- (A)23. 趙先生因甲狀腺腫瘤切除後，意外傷及副甲狀腺造成副甲狀腺機能不足。下列有關術後之立即症狀，何者正確？(A)出現許伏斯德克氏徵象 (Chvostek's sign) (B)高血鈣、低血磷 (C)異位性鈣化現象 (D)骨質疏鬆
- (C)24. 有關放射碘 (^{131}I) 治療的敘述，下列何者錯誤？(A)女性治療後 6-12 月避免懷孕 (B)治療後 3 天內多喝水 (C)服用前應先進食 (D)治療前 3 週避免使用含碘藥物。
- (B)25. 有關放射碘 (^{131}I) 治療的敘述，下列何者錯誤？(A)目前已製成膠囊，並放置於鉛盒 (B)咬碎後吞服 (C)治療後 7 天內，男性採坐姿尿尿，避免尿液噴濺 (D)孕婦禁止使用
- (D)26. 有關格雷氏病(Grave's disease)之敘述，下列何者錯誤？
(A)低膽固醇血症 (B)好發於 20-40 女男性 (C)甲狀腺素分泌過多所引起 (D)出現黏液水腫
- (D)27. 照顧庫欣氏症候群(Cushing's syndrome)之個案，下列護理處置何者錯誤？(A)監測血糖值的變化 (B)說明採高蛋白、高鈣之飲食 (C)提供安全環境，避免感染與受傷 (D)說明採低鉀之飲食。
- (A)28. 有關庫欣氏症候群 (Cushing's syndrome) 的臨床表徵，下列何者錯誤？
(A)低血壓 (B)中央性肥胖 (C)圓月臉 (D)水牛肩
- (B)29. 有關愛迪生危機 (Addison's crisis) 病人的臨床表徵，下列何者正確？①低血壓 ②心搏減慢 ③高血鉀 ④心臟衰竭 ⑤全身軟弱無力 ⑥腹部、背部及腿部疼痛。
(A) ①②③⑤ (B) ①③⑤⑥ (C) ②③④⑥ (D) ③④⑤⑥。
- (A)30. 長期使用類固醇製劑而導致愛迪生氏症 (Addison's disease) 之病人所呈現的臨床表徵，下列何者錯誤？(A)皮膚與黏膜都會呈現褐色的色素沉著 (B)漸進性的疲累、軟弱無力及體重減輕 (C)出現眩暈等姿位性低血壓以及脫水徵象 (D)女性病人的腋毛與陰毛會出現減少情形
- (C)31. 有關嗜鉻細胞瘤患者的護理措施，下列何者錯誤？(A)平日休閒活動勿突然執行增加腹壓的動作 (B)讓患者充分休息，避免壓力發生(C)鼓勵攝取高維生素、高鈉及高糖食物(D)教導避免喝咖啡、茶
- (D)32. 有關副甲狀腺功能低下之敘述，下列何者正確？
(A)許伏斯德克氏徵象(Chvostek's sign)(-) (B)因高血鈣出現 Chvostek's 徵象，導致肌肉痙攣 (C)因低血磷出現 Trousseau's 徵象，導致手指顫抖 (D)低血鈣。
- (C)33. 有關副甲狀腺功能低下病人之處置與護理，下列何者正確？(A)急性期給予口服 10%calcium gluconate (B)手足抽搐時，注射重碳酸鹽或磷酸鹽，以迅速增加血鈣濃度 (C)床旁放置氣切包、氣管內管、喉頭鏡等物備用 (D)鼓勵攝取乳酪、奶類製品、蛋黃、花椰菜
- (C)34. 有關糖化血紅素 (HbA1c) 的敘述，下列何者正確？(A)當 <10% 表示控制良好 (B)反應過去 6 個月內血糖控制的情形 (C)不受禁食、驗血時間所影響 (D)正常人約 4~9%
- (A)35. 有關糖尿病的藥物治療之敘述，下列何者正確？(A)glipizide 抗血糖藥物，是治療糖尿病的首選藥物，肝腎功能異常者須慎用 (B)glipizide 為磺醯脲類 (sulfonylureas) 抗血糖藥物，與 β 細胞磺醯脲類受體結合，刺激胰島素分泌，應於飯後服用 (C) acarbose 為 α 糖苷酶抑制劑 (α -glucosidase inhibitors)，在小腸抑制澱粉分解，延緩葡萄糖吸收，應於飯前服用 (D) exenatide 為類升糖素肽受體促效劑 (GLP-1 receptor agonists)，促進 GLP-1 的功能，刺激胰島素分泌與抑制升糖素分泌，採肌肉注射
- (C)36. 有關糖尿病患者之運動原則，下列何者錯誤？(A)最好在飯後 1 小時運動，每次 30 分鐘(B)運動時，應隨身攜帶糖果(C)血糖超過 150mg/dL 時勿運動(D)若有額外運動，應於運動前、中補充食物
- (A)37. 張先生 50 歲，患有糖尿病腎病變，下列治療何項錯誤？
(A)鼓勵病人每天多攝取蛋白質 (1.5~2.0 g/天) (B)將糖化血色素控制在 7% 以內 (C)將血壓控制在 130/80 mmHg 以內 (D)血管收縮素轉化酶抑制劑 (ACEI) 可用來控制血壓
- (D)38. 王先生，58 歲，罹患糖尿病 2 年，藉由口服抗血糖藥物、飲食與運動控制血糖，今日在家昏倒救護車送入急診，心跳 118 次/分，血壓 85/50 mmHg，呼吸速率 20 次/分，血糖為 650 mg/dL。下列何者為最可能之診斷？

- (A)乳酸中毒 (B)低血糖昏迷 (C)糖尿病酮酸中毒 (DKA) (D)高滲透壓高血糖狀態 (HHS)
- (B)39. 承上題，有關王先生診斷可能出現的徵象，下列何者錯誤？(A)檢驗血中呈現無或微量酮體 (B)檢驗血漿滲透壓為 280 mOsm/kg (C)皮膚與黏膜乾燥、電解質不平衡 (D)血液容積減少而心搏過速、低血壓
- (B)40. 有關糖尿病酮酸中毒 (DKA) 與高滲透壓高血糖狀態 (HHS) 之臨床處置，下列何者正確？(A)HHS 需補充的水分較少 (B)HHS 需要較多的胰島素治療 (C)HHS 較 DKA 更需補充重碳酸鈉 (D)HHS 不需要補充鉀離子
- (B)41. 有關糖尿病病人足部護理，下列何者正確？①直線修剪趾甲緣 ②每日以溫水浸泡清洗足部 30 分鐘 ③穿著色深、柔軟的尼龍襪，且每日更換 ④足部傷口沖洗後，消毒敷料覆蓋，紙膠固定，應儘速就醫 (A)①② (B)①④ (C)②③ (D)③④
- (B)42. 有關發生蘇莫吉效應 (Somogyi effect) 之敘述，下列何者正確？(A)是一種反彈性低血糖症狀 (B)由於晚餐前注射胰島素過多所引起 (C)治療方式應採逐漸增加胰島素劑量 (D)只發生在第一型糖尿病病人。
- (C)43. 有關過敏性反應的敘述，下列何者正確？(A)接觸性皮膚炎屬第一型過敏反應 (B)紅斑性狼瘡屬第二型過敏反應 (C)血清病屬第三型過敏反應 (D)溶血性貧血屬第四型過敏反應
- (C)44. 人類免疫缺乏病毒(HIV)會侵犯輔助性 T 細胞(T4)，當 T4 低於多少時，即會出現伺機性感染 (opportunistic infections)?(A)1000 個/mm³ (B)500 個/mm³ (C)200 個/mm³ (D)100 個/mm³。
- (A)45. 有關免疫球蛋白特性之敘述，下列何者錯誤？(A)IgE 可通過胎盤 (B)影響 B 細胞分化的是 IgD (C)IgA 可透過母乳提供新生兒免疫保護能力 (D)感染細菌或病毒後最先出現的抗體是 IgM。
- (C)46. 有關免疫反應之身體屏障的敘述，下列何者錯誤？(A)陰道有乳酸桿菌，可防止一般致病菌感染 (B)皮膚和黏膜是身體防禦致病微生物的第一道防線 (C)胃酸及消化酶是屬於特異性免疫反應 (D)由口攝入的生物體，會被胃酸、消化酶分解及破壞。
- (D)47. 有關全身性紅斑性狼瘡 (SLE) 病因學之敘述，下列何者錯誤？(A)可能與基因和環境等因素有關 (B)自體抗體會破壞血液和神經系統 (C)是一種人體產生對抗自己本身抗體所引發的過敏反應 (D)因 B 細胞減少而導致自體抗體的產生。
- (A)48. 全身紅斑性狼瘡 (SLE) 之敘述，何者錯誤？(A) 出現血尿、蛋白尿等狀況時，應多下床活動 (B)若有生育考量，於病情控制良好 6 個月後，再與醫師討論懷孕計畫 (C)慢性疲勞時，建議執行漸進式活動，如步行或游泳等 (D)使用人工淚液潤滑眼睛
- (A)49. 全身紅斑性狼瘡 (SLE) 患者之敘述，何者正確？(A)目前無法治癒，只能降低炎症反應和損傷 (B)最常見的皮膚症狀為頸部及胸部的蝴蝶斑 (C)使用痲子粉減輕搔癢不適 (D)建議不要懷孕以免病情惡化。
- (A)50. 有關全身性紅斑性狼瘡 (SLE) 的診斷檢查，下列何者正確？①ESR 上升 ②血清補體 C3 和 C4 值下降 ③抗核抗體 (ANA) 陰性反應 ④白血球及血小板值上升 ⑤LE cell 呈陽性。(A)①②⑤ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)①③④
- (C)51. 有關全身性紅斑性狼瘡之致病機轉，下列何者正確？(A)是一種急性、發炎性、全身性疾病 (B)屬第四型過敏之自體免疫疾病 (C)是一種人體產生對抗自己本身抗體所引發的過敏反應 (D)紅血球沉降速率 (ESR) 下降
- (D)52. 有關全身性紅斑性狼瘡之敘述，何者錯誤？(A)最常見的心臟病變是心包膜炎 (B)常見關節發炎、疼痛、腫脹 (C)抗體抗原形成之免疫複合物沉積在血管壁造成發炎與組織壞死 (D)須長期使用高劑量類固醇來控制炎症症狀，勿停藥
- (A)53. 有關全身性紅斑性狼瘡病人之照護，下列何者錯誤？(A)非類固醇抗發炎藥物(NSAIDs)與利尿劑合用，有助於控制高血壓。(B)服用氯奎寧 (plaquenil) 藥物，應每 4~6 個月檢查眼睛與視力 (C)服用類固醇藥物，衛教攝取高蛋白、低糖、限鈉、高鈣、高鉀 (D)服用抗感染藥物，可以預防因藥物抑制免疫功能而出現的感染現象。
- (A)54. 感染人類免疫缺乏病毒者，其體內含病毒濃度較高的體液為何？(A)精液(B)眼淚(C)唾液 (D)尿液
- (D)55. 有關後天免疫缺乏症候群 (Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS) 之敘述，下列何者錯誤？(A)不會經由握手、擁抱、共餐、共用馬桶、游泳、蚊蟲叮咬等途徑傳染病毒 (B)有皮膚疾患或懷孕的醫療人員不應直接對病人進行醫療照護 (C)由於病人容易產生伺機性感染，避免到人多擁擠的公共場所 (D)病人應定期接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 (MMR) 與流感疫苗
- (D)56. 醫護人員在照顧愛滋病患者時，所採取之防護措施何者有誤？(A)「全面性防護」是將所有人的血液、體液均視為感染性，以預防未篩檢出的疾病入侵 (B)對血液及其他標本應貼上醒目「血清危險」標誌 (C)若衣物被病人分泌物污染，應以漂白水浸泡後再清洗 (D)若不慎接觸糞便須立刻口服 400 mg 反轉錄酶抑制劑 (AZT)
- (C)57. 有關愛滋病檢驗的敘述，下列何者錯誤？(A)T4 與 T8 的比值小於 1 (B)出現伺機性感染，如肺囊蟲肺炎 (C)主要感染帶有 CD8 受體的細胞 (D)酵素免疫分析法最常用於篩檢 HIV 感染

- (C)58. 下列何種伺機性感染是愛滋病病患致死的主要原因？
 (A)巨細胞病毒感染症 (B)隱孢子蟲感染症 (C)肺囊蟲肺炎 (D)毒漿原蟲症。
- (D)59. 有關照護愛滋病人之敘述，下列何者錯誤？(A)致病病毒為「人類免疫缺乏病毒(human immunodeficiency virus;HIV)」，為雙鏈 RNA，一種反轉錄病毒 (B)導致 T 淋巴球數目減少 (C)易併發肺囊蟲肺炎伺機性肺部疾病 (D)免疫血清球蛋白 IgA 及 IgG 值下降
- (A)60. 有關後天免疫缺乏症候群合併症之敘述，下列何者錯誤？
 (A)病理檢查發現 CD8+細胞<200/mm³ (B)肺炎鏈球菌感染之症狀為視網膜炎與腦膜炎
 (C)肺囊蟲肺炎症狀為乾咳和呼吸困難 (D)約有 2/3 病患會出現卡波西氏肉瘤。
- (B)61. 有關類風濕性關節炎之敘述，下列何者正確？①手部關節會出現尺側偏斜 ②活動後有僵硬的現象 ③關節 X 光變化呈現關節腔變窄 ④關節腫脹呈現不對稱性 (A)①② (B)①③ (C)②④ (D)③④
- (C) 62. 有關軟組織損傷病人的護理評估結果，下列何者顯示可能有腔隙症候群？
 (A)周邊脈搏強度 2+ (B)微血管填充時間小於 3 秒 (C)肢端蒼白、變冷 (D)皮膚出現瘀斑。
- (D) 63. 有關腔隙症候群的處置，下列何者正確？
 (A)肢體抬高超過心臟 (B)患肢冷熱敷 (C)彈繃加壓包紮 (D)去除敷料、夾板或石膏
- (D) 64. 有關骨折病人使用勃克式牽引 (Buck's traction) 的敘述，下列何者錯誤？
 (A)是一種直線式皮膚牽引 (B)可以緩解下背部肌肉的痙攣或疼痛
 (C)常用於髖部或股骨骨折手術前的制動 (D)膝窩及腳跟應懸空以避免血液循環受阻。
- (C) 65. 病人近端指關節形成蒲夏氏結節，遠多形成希伯登氏結節，下列何者為其最可能之診斷？
 (A)類風溼性關節炎 (B)骨質疏鬆症 (C)骨性關節炎 (D)痛風性關節炎。
- (B) 66. 有關痛風性關節炎急性期病人之護理指導，下列何者正確？(A)服用秋水仙素 (Colchicine) 要定期檢查眼睛 (B)應該減少肉類、海鮮及啤酒的攝取，以預防疾病發作 (C)睡覺時應維持肢體屈曲的姿勢，以降低關節疼痛 (D)執行全關節運動可以減輕患部腫脹。
- (C) 67. 類風溼性關節炎之敘述，下列何者正確？(A)受侵犯的關節一段時間不活動就會僵硬，特別是晚上睡覺時 (B)屬第二型過敏反應 (C)症狀通常是兩側對稱性地發生 (D)好發於老年女性。
- (D) 68. 類風濕性關節炎治療之主要目的，下列何者錯誤？
 (A)積極治癒疾病 (B)預防關節畸形 (C)保存關節功能 (D)減輕關節疼痛
- (D) 69. 下列何者可檢測病患的膝關節有軟組織突出？
 (A)Phalen's test (B)Thomas test (C)Bulge sign (D)McMurray's test 。
- (D) 70. 下有關退化性關節炎的敘述，何者錯誤？(A)男性好犯髖關節，女性是手部關節(B)好發於較大的負重關節(C)續發性原因可能為姿勢不良、外傷、肥胖(D)急性發炎期患部關節熱敷可減輕疼痛與腫脹
- (C) 71. 有關退化性關節炎之敘述，下列何者正確？(A)出現血管炎，如腳趾壞死或小腿潰瘍 (B)抗細胞核抗體(ANA)升高 (C)不會影響身體的其他系統 (D)關節滑液呈現混濁，黏性低、蛋白質增加
- (B) 72. 有關全髖關節置換術之敘述，下列何者錯誤？(A)非感染性鬆脫是手術後最常見的合併症 (B)教導翻身時，雙腿中間仍需夾著內展枕 (C)強調髖關節屈曲不可超過 90 度 (D)鼓勵患肢作等長收縮運動
- (B) 73. 有關脂肪栓塞之敘述，下列何者錯誤？(A)會造成血管內血小板凝集反應 (B)症狀發展慢 (C)與肺栓塞不易區隔 (D)常發生於長骨骨折之後。
- (C) 74. 下列何種拐杖步態是「雙側拐杖和患肢同時前進，健肢再行至與其平行位置」？
 (A)搖擺式 (B)二點式 (C)三點式 (D)四點式。
- (D) 75. 有關前列腺癌之敘述，下列何者正確？(A)藥物治療大多使用雄性素 (B)放射線治療時最常使用鈷 60 放射源 (C)鹼性磷酸酶值過高與前列腺癌之診斷有關 (D)前列腺特异性抗原 (PSA) 濃度可做為治療效果的參考
- (D) 76. 有關乳癌高危險群的敘述，下列何者錯誤？(A)母親或姊妹罹患過乳癌者 (B)高脂肪飲食習慣者 (C)初經越早或停經越晚者 (D)生產次數越多者
- (B) 77. 有關乳癌的敘述，下列何者錯誤？(A)約 5~10% 乳癌與遺傳有關 (B)多數乳癌腫塊會有疼痛感 (C)乳房自我檢查不能檢測到所有的腫瘤 (D)最常發生部位為乳房外上四分之一。
- (B) 78. 攝護腺肥大的典型臨床表徵，下列何者錯誤？(A)頻尿 (B)多尿 (C)尿失禁 (D)排尿困難。
- (A) 79. 有關睪丸癌最主要的危險因子，下列何者正確？(A)隱睪症 (B)精索曲張 (C)長期接觸金屬物 (D)無精蟲症
- (D) 80. 有關子宮頸癌(Cervical Cancer)之敘述，何者錯誤？(A)好發於 45 歲以上之女性 (B)缺少足夠的葉酸可能易罹患子宮頸癌 (C)95% 是鱗狀細胞癌 (D)晚期症狀為性交後出血