

# 崇仁醫護管理專科學校 106 級護理師執照考

## <第二次模擬競試>

科目：產科護理學（共 4 頁）

班級：

姓名：

學號：

一、選擇題：每題 1.25 分，總分 100%

- (C) 1. 有關生產教育的觀念，下列何者正確？①由醫護團隊主導生產過程，減少孕婦生產壓力②讓孕婦因應懷孕與分娩照護的過程③朝向以家庭為中心的照護④強調一定不要使用藥物性減痛方法。  
(A)①② (B)③④ (C)②③ (D)①④。
- (D) 2. 護理師於婦女產後經由電話協助母親解決哺乳問題，屬於下列何種角色？  
(A)照顧者 (B)管理者 (C)研究者 (D)諮詢者。
- (C) 3. 有關生產計畫書，下列敘述何者不適當？(A)計畫書可包括待產、分娩和寶寶照護項目之選擇 (B)計畫書可包括生產流程與常規的說明 (C)讓婦女和醫護人員討論，兩者共同做決定 (D)鼓勵婦女表達其擔憂與需要。
- (C) 4. 下列何者不屬於腦下垂體所分泌之促性腺激素 (pituitary gonadotrophic hormones)？  
(A)濾泡刺激素 (follicular stimulating hormone; FSH) (B)黃體生成素 (luteinizing hormone; LH) (C)動情激素 (estrogen) (D)催乳激素 (prolactin)。
- (C) 5. 有關卵子形成過程，下列何者正確？(A)初級卵母細胞於青春開始形成 (B)初級卵母細胞內含有單套染色體 (C)受精的卵子會經過 2 次減數分裂 (D)一個卵細胞可發育成 4 個成熟的卵子。
- (C) 6. 有關胎兒發育之敘述，下列何者錯誤？(A)懷孕第 4 週開始有心跳 (B)懷孕第 8 週所有器官都形成 (C)懷孕第 16 週眼睛可感受到外界光線 (D)懷孕第 20 週有規律的睡眠和活動。
- (A) 7. 懷孕 11 週後，分泌雌性素與黃體素的主要來源是：(A)胎盤 (B)黃體 (C)腦下垂體後葉 (D)腎上腺皮質
- (A) 8. 有關胚胎附屬器官發育的敘述，下列何者正確？(A)絨毛膜是由囊胚滋養層細胞發育而來 (B)羊膜是胚胎膜最外層 (C)羊水因含有胎兒尿液，故呈弱酸性 (D)羊水量會隨著妊娠週數的增加而遞增，於懷孕 40 週達最高峰。
- (D) 9. 下列何者不是胎兒的造血器官？(A)卵黃囊 (B)肝臟 (C)骨髓 (D)胰臟。
- (A) 10. 有關胎兒呼吸系統發育之敘述，下列何者正確？(A)受孕 15~17 週已有氣管及支氣管形成 (B)肺泡管的發育開始於受孕第 7 個月 (C)卵磷脂 (lecithin) 與抱合髓磷脂 (sphingomyelin) 的比值小於 1 表示肺部已成熟 (D)胎兒出生前肺臟在子宮內已具有部分呼吸功能。
- (A) 11. 懷孕 28 週婦女參加產前媽媽教室，練習母乳哺餵姿勢和嬰兒沐浴，此為下列何種母性認同行為之表現？(A)角色扮演 (B)模仿學習 (C)內射—接受 (D)幻想—外射。
- (B) 12. 罹患妊娠糖尿病婦女，努力控制飲食，讓飯後血糖值在正常範圍，此為魯賓 (Rubin) 所提出何種母性任務行為？(A)學習貢獻自己 (B)確保自己和胎兒安全 (C)使胎兒能被家人和重要他人所接受 (D)與胎兒產生情感連結。
- (C) 13. 有關妊娠期婦女甲狀腺分泌功能變化的敘述，下列何者正確？(A)妊娠期婦女基礎代謝率增加，甲狀腺素 (thyroxine, T4) 的分泌會受到抑制 (B)妊娠期甲狀腺功能亢進的婦女，易發生自發性流產 (C)甲狀腺結合血清蛋白平均值在第二妊娠期達到最高 (D)妊娠期甲狀腺素值會升高，但三碘甲狀腺素 (triiodothyronine, T3) 值則下降。
- (D) 14. 懷孕 8 週的婦女，經常反覆思考「繼續工作」或「擔任專職母親」，此種心境較屬於下列何種孕期心理反應？(A)接受懷孕事實 (B)注意力集中在自己 (C)不切實際的幻想 (D)矛盾心理。
- (C) 15. 鄭女士因月經過期 8 週而至門診驗孕，她已有一對雙胞胎子女，曾於懷孕 8 週時胚胎因無胎心音而入院接受中止妊娠術，此次門診確認鄭女士已懷孕，因此其孕產史紀錄，下列何項正確？  
(A)G4P2 (B)G3P1SA1 (C)G3P1AA1 (D)G4P2AA1。
- (C) 16. 下列何種方式是依據懷孕婦女子宮底高度位置推估預產期？(A)最後一次月經週期 (LMP) (B)內格萊式法則 (Nagel's rule) (C)麥當勞法則 (McDonald's rule) (D)雙頂徑 (BPD)。
- (A) 17. 有關妊娠期 B 群鏈球菌感染之敘述，下列何者正確？(A)胎兒若受到垂直感染，多在出生 7 天內發病 (B)妊娠 20 週接受羊膜穿刺術以篩檢孕期婦女是否受感染 (C)菌種經常存活在婦女的鼻腔及呼吸道 (D)預防胎兒受到感染，唯有採行剖腹生產。
- (B) 18. 王女士懷孕 38 週，胎位為左枕前位 (LOA)，胎心音的測量最合宜的部位為？  
(A)右側臍棘線中點 (B)左側臍棘線中點 (C)肚臍與恥骨連合線上中點 (D)腸骨兩側。
- (D) 19. 一般建議孕期無壓力試驗 (NST) 開始測試的時間點和目的之敘述，下列何者正確？  
(A)24 週，檢測胎兒呼吸成熟度 (B)24 週，檢測胎兒神經成熟度 (C)32 週，檢測胎兒呼吸成熟度 (D)32 週，檢測胎兒神經成熟度。

- (B) 20. 羊膜穿刺術理想檢測時間為懷孕16~18週，下列何者不是考量此時間點檢測的主要原因？  
 (A) 此時期足夠羊水量，約200 mL (B) 此時  $\alpha$  胎兒蛋白 (AFP) 分泌濃度最高  
 (C) 子宮已上升至恥骨聯合之上，易操作 (D) 羊水中存活細胞比率最大，易培養。
- (C) 21. 有關妊娠9週的超音波檢查評估項目，下列何者錯誤？(A) 股骨長度 (femur length; FL)  
 (B) 妊娠囊 (gestational sac) (C) 雙頂徑 (biparietal diameter; BPD) (D) 頭臀長 (crown-rump length; CRL)
- (C) 22. 有關無壓力試驗 (Non-stress test) 的敘述，下列何者正確？(A) 胎心音維持在 140 下/分、變異性  $< 5$  bpm，表示胎心音穩定，為反應型 (B) 若出現 20 分鐘沒有胎動，則應馬上報告，緊急處理  
 (C) 若 20 分鐘有 2 次以上胎動，胎動時心跳上升 15 bpm 持續 15 秒，為反應型  
 (D) 試驗期間約 20~30 分鐘，孕婦必須平躺以確保記錄正確。
- (A) 23. 有關唐氏症候群篩檢之敘述，下列何者正確？(A) 母血篩檢值高於 1/270 時，則歸為高危險群  
 (B) 羊膜腔穿刺合適的檢查時間是妊娠 10~16 週之間 (C) 母血篩檢可作為確立唐氏症候群的診斷方法  
 (D) 母血唐氏症篩檢加上頸部透明帶的檢測，其假陽性率高。
- (A) 24. 有關懷孕36週婦女測量胎動之護理指導，下列何者錯誤？  
 (A) 測量最佳時機為早上尚未下床前 (B) 孕婦可將手放在腹部，在安靜的地方監測  
 (C) 2小時胎動發生十次以上表示胎兒狀況良好 (D) 可採半坐臥或側臥姿勢測量胎動。
- (C) 25. 一位孕前BMI為23.1 kg/m<sup>2</sup>的單胞胎孕婦，有關其孕期體重之護理指導，下列何者最適當？  
 (A) 第一孕期如體重未增加，需要增加熱量攝取 (B) 第二孕期，體重增加每個月應少於1公斤  
 (C) 第三孕期，每個月體重增加可控制在1.5~2.0公斤之間  
 (D) 整個孕期體重需增加控制在7~10公斤範圍內。
- (B) 26. 林女士28歲，孕前體重56公斤，目前懷孕20週，此次產檢體重為64公斤，血壓為148/94mmHg，尿蛋白1+，下列護理指導何者最適當？  
 (A) 增加脂肪攝取 (B) 減少鹽分攝取 (C) 減少蛋白質攝取 (D) 增加鈉攝取。
- (C) 27. 具有伸展會陰部肌肉功用的產前運動項目，下列何者最相關？  
 (A) 扭轉骨盆運動 (B) 大腿伸展運動 (C) 蹲踞運動 (D) 抬腿運動。
- (B) 28. 採全素食之孕婦，容易缺少下列何種營養素？(A) 維生素B12、鋅、維生素D  
 (B) 維生素B12、鐵、鋅 (C) 維生素C、維生素B12、鐵 (D) 維生素C、鈣、維生素D。
- (C) 29. 有關孕期葉酸攝取的護理指導，下列何者錯誤？(A) 懷孕前可開始補充葉酸 (B) 孕期葉酸攝取可預防胎兒脊柱裂發生 (C) 豆類是葉酸最佳來源之一 (D) 葉酸易受高溫和紫外線破壞，須注意保存
- (B) 30. 有關孕婦缺鐵性貧血之敘述，下列何者錯誤？(A) 新生兒出生後採延遲斷臍 (B) 補充鐵劑應於飯前服用以利吸收 (C) 鐵劑可與維生素C同時服用以利吸收 (D) 鼓勵多攝取紅色肉類及深綠色蔬菜
- (B) 31. 下列何者為子宮收縮頻率 (frequency) 的定義？(A) 子宮收縮時所持續增加的壓力 (B) 一次子宮收縮開始到下次宮縮開始之時間 (C) 子宮收縮結束之後的平靜期 (D) 每次子宮收縮的開始到結束之時間
- (A) 32. 有關分娩時經產婦的子宮頸變化之敘述，下列何者正確？(A) 子宮頸變薄與擴張同時進行  
 (B) 子宮頸先擴張，再變薄 (C) 子宮頸先變薄，再擴張 (D) 潛伏期時，子宮頸變薄變短程度為 90~100%
- (B) 33. 有關生產過程中子宮肌肉活動的敘述，下列何者錯誤？(A) 胎兒先露部位壓迫子宮頸口會促進其變薄的程度 (B) 子宮出現生理性收縮環，上段肌肉會變薄 (C) 羊膜腔形成的靜水壓會促進子宮頸口的擴張程度 (D) 宮縮時胎兒軸壓力的形成會促進子宮頸口擴張。
- (B) 34. 胎兒以面產式，胎頭完全仰伸進入骨盆時，呈現的徑線為下列何者？  
 (A) 枕額徑 (OF) (B) 額下前囟徑 (SMB) (C) 枕額徑 (OM) (D) 枕下前囟徑 (SOB)。
- (D) 35. 有關真陣痛 (true pain) 的敘述，下列何者正確？(A) 通常走動會減輕不適 (B) 子宮收縮不規則 (C) 疼痛集中在腹股溝部位 (D) 子宮收縮會使子宮頸變薄。
- (D) 36. 產婦進入待產過程中，護理師協助陰道內診，無法獲得下列何項資料？  
 (A) 子宮頸厚薄 (B) 子宮頸擴張 (C) 胎頭下降程度 (D) 胎兒大小。
- (B) 37. 初產婦廖女士進入產房待產，足月且孕期無其他併發症，目前每5分鐘子宮收縮一次，每次約收縮30秒，沒有破水，陰道有粉色分泌物，內診發現其子宮頸變薄80%且已擴張3公分，station 0。廖女士詢問是否可以下床走動，下列回應何者較適切？(A) 我無法做決定，妳最好去問醫師  
 (B) 只要妳覺得舒服，儘可下床活動 (C) 應躺在床上，以免走路活動影響子宮收縮  
 (D) 建議妳臥床休息，我們比較容易監測子宮收縮及胎心音。
- (D) 38. 有關待產的麻醉藥物減痛之敘述，下列何者正確？  
 (A) 目前剖腹產常使用全身麻醉方式 (B) 腰椎硬膜外麻醉法施用於子宮頸口擴張 2 公分時  
 (C) 腰椎硬膜外麻醉法需要注意呼吸抑制及高血壓現象 (D) 腰椎硬膜外麻醉法針頭刺入部位為 L3~4
- (B) 39. 李女士，子宮頸口開 4 公分，擬採腰椎硬脊膜外阻斷麻醉。護理師先行給予林格氏液 Lactated Ringer's solution 500 c.c.，其維持靜脈輸液的主要目的是：  
 (A) 減輕噁心嘔吐 (B) 預防血壓過低 (C) 減輕頭痛現象 (D) 加速產程進展。
- (D) 40. 第二產程胎頭娩出時，為了減少會陰部撕裂傷，下列措施何者較不適當？  
 (A) 請產婦哈氣 (B) 請產婦採喘息呼吸 (C) 讓產婦採側躺 (D) 將產婦臀部墊高。

- (B)41. 王女士想了解溫柔生產的照護方式，下列護理指導何者錯誤？(A)待產期間可以自由走動 (B)常規執行會陰部剃毛 (C)生產時先生可以陪產 (D)產後立即進行產後肌膚接觸。
- (D)42. 王女士第一胎，目前子宮頸開 6 公分，當宮縮時，閉眼睛不理人，下列何種護理措施較不適當？(A)引導放鬆呼吸技巧 (B)提供音樂分散注意力 (C)手握產婦雙手陪伴在旁 (D)提供止痛藥或麻醉劑訊息以供選擇。
- (D)43. 潛伏期待產婦最可能有的行為反應為何？(A)會不自主想要向下用力 (B)將注意力及能量集中在產痛上 (C)顯得疲累失去自我控制感 (D)精力充沛、興奮、有信心接受分娩挑戰。
- (A)44. 下列何者為宮縮時胎心率加速之臨床意義？(A)正常現象 (B)胎頭受壓迫 (C)胎盤功能不良 (D)臍帶受壓迫。
- (B)45. 林女士第一胎，懷孕 40 週因自然破水入院，依醫囑使用催產素。護理師發現胎心率出現晚期減速，此時最優先的護理措施為何？(A)測量血壓、脈搏、呼吸 (B)停止催產素滴注 (C)先密切觀察 30 分鐘 (D)採膝胸臥式。
- (B)46. 產婦於第三產程後，依醫囑施打宮縮藥物(Methergine®, Ergonovine)。護理師於下列何種情況需停止給藥？(A)主訴全身發熱 (B)血壓 150/100 mmHg (C)呼吸不規則 (D)脈搏 68~72 次/分。
- (C)47. 下列哪項胎心率的週期性變化和子宮收縮無關？(A)早期減速 (B)晚期減速 (C)變異性減速 (D)變異性加速。
- (A)48. 有關母乳之敘述，下列何者正確？(A)後奶 (hindmilk) 較白，富含脂肪，熱量較前奶高 (B)前奶 (foremilk) 清淡，富含酪蛋白 (C)嬰兒吸食前奶才能得到足夠的營養及水分 (D)母乳哺餵時，仍需補充水分給嬰兒。
- (A)49. 有關產後婦女生理復舊變化之敘述，下列何者正確？(A)產後初期有利尿現象，可將身體組織囤積過多的液體排出體外 (B)生產過度用力或脫水，產後體溫會上升至 38°C，持續約 2~3 天 (C)產後脈搏速率會增快至 100 次/分，於產後 3~7 天恢復正常 (D)產後初期腹肌鬆弛，腹壓減少，使得腸蠕動增快，而有輕瀉現象。
- (D)50. 有關產後泌尿系統的變化，下列敘述何者錯誤？(A)會陰傷口或裂傷使產婦對膀胱漲滿的敏感度減低 (B)產後 12~24 小時會藉利尿作用將孕期積聚過多的液體排出 (C)產後 2~3 天尿量可高達一天 3,000 c.c. (D)產後第 10 天尿量開始恢復正常。
- (A)51. 有關母嬰親善醫院的 10 項措施，下列何者可直接促進親子依附關係？(A)生產後於產後立即性肌膚接觸 (B)除非醫療需求，不提供配方奶 (C)不使用奶瓶奶嘴餵食 (D)提供產婦母乳支持團體
- (A)52. 下列何者為子宮復舊不全的現象？(A)產後 18 天在腹部觸摸到子宮底 (B)產後子宮底每天約下降 1~2 cm (C)產後 1 週子宮重量下降至 500 公克 (D)產後第 1 天子宮底高度臍平。
- (B)53. 產後會陰傷口評估所使用的項目縮寫為何？(A)HELLP (B)REEDA (C)Rubin's test (D)Kegel's test
- (C)54. 依據世界衛生組織及聯合國兒童基金會推行的政策，要成為母嬰親善醫院需符合下列哪一項規定？(A)要求所有母親均需在產後即開始哺餵母乳 (B)醫院實施每天 8 小時親子同室 (C)除非有醫療特殊需要，否則不給嬰兒母乳以外的食物，包括水、葡萄糖水或配方奶 (D)醫療人員可提供嬰兒人工奶嘴或安撫奶嘴，以緩解哺餵母親乳頭的負擔。
- (C)55. 有關陰道生產後評估結果的敘述，下列何者為異常現象？(A)產墊上的惡露量少，呈紅色，有血腥味 (B)會陰傷口輕微紅腫，切開傷口邊緣無分泌物 (C)在右側可摸到鬆軟且位置偏高的子宮底 (D)檢查下肢的霍曼氏徵象(Homan's sign)為陰性反應
- (D)56. 有關母乳與配方奶差異的敘述，下列何者正確？(A)母乳中的乳糖含量較低，嬰兒較不易肥胖 (B)母乳的鐵質含量比配方奶高，有助嬰兒發育 (C)母乳的熱量較高，嬰兒較容易有飽足感 (D)母乳中富含 IgA，可增強嬰兒免疫力。
- (C)57. 劉女士第一胎，依據魯賓(Rubin)對產後婦女行為態度之研究結果判斷，下列敘述何者表示劉女士處於接受期(taking-in phase)？(A)寶寶為什麼一直睡覺？ (B)我要怎麼樣才能讓奶水量增加？ (C)生小孩好痛，下次再也不要生了 (D)我的先生晚上照顧寶寶，現在他很累。
- (B)58. 劉女士剖腹產後因身體不適，且寶寶黃疸需住院照光治療而無法一同出院，她覺得自己不是好媽媽。下列何項措施對其親子依附關係的建立較不適當？(A)評估劉女士對自己身體復原與對寶寶照護的擔心 (B)為避免感染，新生兒住院期間不鼓勵媽媽探訪 (C)運用產婦的支持資源，讓產婦能將心力放在新生兒身上 (D)鼓勵產婦與新生兒有眼對眼及身體上的接觸。
- (A)59. 有關 Rubin 提出之產後心理適應中的緊執期 (taking-hold phase) 之敘述，下列何者正確？(A)是產後介於依賴與獨立間的一段時間 (B)話多，喜歡談論懷孕生產過程，以幫助確認孩子已與她分離 (C)接受孩子是一獨立個體，也很注重自己的生理需求 (D)確認孩子的個性及需求，重新設定為人母的角色。
- (C)60. 有關產後心理適應，下列敘述何者錯誤？(A)產後情緒低落(postpartum blue)大多發生於產後第 5 天 (B)當產後情緒低落惡化時，可能形成產後憂鬱 (postpartum depression)，主要發生於產後 1 年內 (C)經產婦是罹患產後憂鬱 (postpartum depression) 的危險因子 (D)產後精神病 (postpartum psychosis) 的症狀會有失眠、譫妄、幻覺、想法和行為紊亂等。

- (D)61. 孕婦早期破水的評估與處置，下列何者錯誤？(A)觀察陰道分泌物的顏色及味道 (B)監測白血球及 C 反應蛋白的變化 (C)盡量減少陰道內診次數，以降低感染機會 (D)確認懷孕 34~36 週者胎兒的成熟度，如已成熟即可剖腹產。
- (D)62. 王女士，因早期子宮收縮入院，以 yutopar 安胎治療，下列何者為此藥最常見的副作用？(A)嗜睡 (B)便秘 (C)口乾 (D)心悸。
- (A)63. 有關早產傾向之高危險婦女自我照顧事項，下列護理指導何者正確？(A)每日攝取 2,000~3,000 c.c. 足夠的水分 (B)每日清潔按摩乳頭，一旦早產時有利母乳哺餵 (C)安胎治療穩定後的孕婦應不須限制活動 (D)多攝取含咖啡因的食物以增進胎心搏率。
- (A)64. 有關胎盤早期剝離婦女產後護理處置之敘述，下列何者正確？(A)預防產後大出血及持續觀察凝血機制 (B)胎盤娩出後不可給予任何子宮收縮劑，以防血壓升高的副作用 (C)胎盤剝離處接近陰道，產生逆行性感染的機會高 (D)發生瀰漫性血管內凝血(DIC)症狀的高峰期為產後 1 星期。
- (C)65. 孕婦在待產時，突然感覺腹部一陣劇烈陣痛，接著宮縮停止，而且無法測到胎心音。此情況可能是發生了下列何種情形？(A)低張性子宮收縮 (B)早期破水 (C)子宮破裂 (D)羊水栓塞。
- (C)66. 若待產婦有臍帶脫垂的情況時，應避免採用下列哪一種姿勢？(A)膝胸臥式 (B)垂頭仰臥式 (C)半坐臥式 (D)下肢抬高之側臥式。
- (D)67. 有關硫酸鎂(MgSO<sub>4</sub>)在安胎使用的敘述，下列何者錯誤？(A)需監測尿量 (B)用藥過量時可能抑制深部肌腱反射 (C)可利用生化檢驗監測血中濃度 (D)血中濃度過高可使用 halothan 拮抗。
- (D)68. 有關剖腹產術後照護之敘述，下列何者錯誤？(A)平躺時可將頭側一邊，避免分泌物阻塞呼吸道 (B)產後 1 小時內每隔 15 分鐘測量生命徵象 (C)術後導尿管須留置至少 8 小時 (D)等產婦可下床活動時，再哺餵母乳。
- (B)69. 以比夏計分法 (Bishop's score) 評估產婦引產的難易度，下列何者錯誤？(A)子宮頸擴張 (B)胎兒體重 (C)胎頭位置 (D)子宮頸堅硬度。
- (C)70. 當待產婦使用 PGE<sub>2</sub> 陰道栓劑後，護理師需要監測下列何種變化？(A)子宮頸平滑肌收縮 (B)胎兒肺部成熟 (C)子宮頸軟化成熟 (D)子宮頸水腫。
- (A)71. 有關真空吸引協助胎兒娩出之敘述，下列何者錯誤？(A)適用胎頭骨盆不相對稱時 (B)娩出後胎兒頭部可能會有血腫 (C)需要由有經驗的醫師執行 (D)抽吸罩放置於胎頭的枕骨上
- (B)72. 下列何者為陰道產的產後出血定義？(A)產後 12 小時內，出血超過 500 c.c. (B)產後 24 小時內，出血超過 500 c.c. (C)產後 12 小時內，出血超過 250 c.c. (D)產後 24 小時內，出血超過 250 c.c.。
- (D)73. 有關三度會陰撕裂傷的範圍，下列何者正確？(A)從直腸黏膜延伸至直腸 (B)從皮膚及陰道黏膜延伸至會陰肌肉 (C)在皮膚或陰道黏膜 (D)從皮膚、陰道黏膜、會陰肌肉延伸至肛門括約肌。
- (C)74. 張女士，產後 2 小時自恢復室返室，惡露呈鮮紅色，1 小時內即浸溼整片產墊，下列敘述何者正確？①此為早期出血 ②此為晚期出血 ③可能與子宮收縮不良有關 ④可能與胎盤組織殘留有關。(A)僅①③ (B)僅②④① (C)①③④ (D)②③④。
- (D)75. 有關產褥感染，下列何者正確？①其定義是產後任 2 天體溫在 38°C 或 38°C 以上 ②最常見的細菌為陰道內的細菌，例如 B 群鏈球菌 ③以腸胃道感染最常見 ④每天至少需 2,500~3,000 毫升的水分攝入。(A)①② (B)②③ (C)③④ (D)②④。
- (A)76. 有關產後性行為(sexual intercourse)的護理指導，下列敘述何者最適當？(A)建議惡露乾淨與會陰傷口癒合後才有性行為 (B)母乳哺餵的母親因泌乳激素較高易導致陰道乾燥 (C)產後陰道潤滑性減少，可用脂溶性潤滑劑促進潤滑 (D)因會陰傷口復原之需要，故產後八週後才能有性行為。
- (D)77. 乳腺炎 (mastitis) 與乳房充盈 (engorgement) 之比較，下列何者錯誤？(A)患乳腺炎時通常為單側，乳房充盈為雙側 (B)患乳腺炎及乳房充盈之個案，皆有可能發燒 (C)患乳腺炎及乳房充盈之個案，皆感覺乳房腫脹與疼痛 (D)二者皆易發生於產後 1~4 週。
- (D)78. 李女士剖腹生產後第 1 天，生命徵象正常，尚未排氣，惡露為少量的深紅色，下列護理指導何者適當？(A)避免下床活動以免傷口疼痛影響腸蠕動 (B)因乳汁尚未分泌暫不進行母乳餵食 (C)惡露量為異常應注意有內出血情形 (D)教導腿部運動以防血栓靜脈炎。
- (C)79. 楊女士產後第 10 天，仍有輕微足踝水腫情形，其他的生理徵象均正常，護理師給予的指導何者最適宜？(A)採低鹽飲食 (B)穿緊縮的襪子促進血液回流 (C)坐著時不要交叉雙腿 (D)多臥床休息，並減少活動。
- (A)80. 王女士，Rh(-)，初產下一位 Rh(+)的女嬰，母女均安。為了預防下次懷孕時產生胎兒大量溶血，給予母體注射 Rh0 免疫球蛋白之時機，下列何者最適當？(A)此胎產後 72 小時內 (B)此胎產後 6~8 週 (C)下次懷孕 28 週時 (D)下次懷孕產後立即。