

崇仁醫護管理專科學校 107 級護理師執照考

<第 1 次模擬競試>

科目：產兒科護理學（共 5 頁）

班級：

姓名：

學號：

一、選擇題：每題 1.25 分，總分 100%

- C 1. 有關臺灣產科護理現況之敘述，何者正確？(A)政府有多項鼓勵生育措施，促使產科醫師成為熱門科別 (B)擁有助產師執照的護理師僅能以單一證照執業 (C)母嬰親善醫院政策已列入醫院評鑑項目之一 (D)孕產婦死亡率有增加的趨勢，主要死因為妊娠糖尿病。
- D 2. 有關臺灣家庭結構改變的敘述，何者錯誤？
(A)晚婚晚育造成高齡產婦的問題日增 (B)女性在兼顧家庭與職場的衝突下，易延後適婚年齡
(C)離婚造成單親家庭日增，對家庭結構與性別角色造成衝擊
(D)雙薪家庭的增加及經濟能力的提升，因而提升目前生育率。
- A 3. 懷孕 35 週婦女，鼠蹊部痛主因哪一條子宮韌帶受牽扯造成？
(A)圓韌帶 (B)闊韌帶 (C)主韌帶 (D)子宮骶骨韌帶。
- B 4. 有關經前症候群的敘述，何者錯誤？(A)均衡的飲食、規律的運動有助於減輕經前不適
(B)經痛時可以冰敷來減輕疼痛 (C)必要時可使用穴位指壓，來緩解經前不適症狀
(D)必要時可使用藥物，來緩解經前不適症狀。
- C 5. 有關胎兒發育之敘述，何者錯誤？(A)懷孕第 4 週開始心跳 (B)懷孕第 8 週所有器官都形成
(C)懷孕第 16 週眼睛可感受外界影像 (D)懷孕第 20 週有規律活動。
- D 6. 下列何者不是胎兒的造血器官？(A)卵黃囊 (B)肝臟 (C)骨髓 (D)胰臟。
- A 7. 「孕婦放棄出國進修計畫或夢想，學習付出。」屬於魯賓 (Rubin) 提出何項孕期母性任務？
(A)貢獻自己 (B)確保家人接受 (C)確保母嬰安全 (D)與胎兒連成一體。
- B 8. 黃太太主訴腹部由臍至陰阜中央出現一條黑褐線。此皮膚上變化與下列何者，有相同之原因？
(A)血管蜘蛛痣 (B)妊娠面具 (C)妊娠紋 (D)汗腺活性增加。
- A 9. Leopold 四段觸診無法得知何項資料？(A)變薄 (effacement) (B)胎軸 (fetal lie)
(C)先露部 (presenting part) (D)胎勢 (fetal attitude)。
- C 10. 林女士，目前懷孕 24 週，產檢時測得子宮底高度為 21 公分，則代表：
(A)胎兒過小 (B)胎兒過大 (C)胎兒大小和週數符合 (D)胎兒子宮內缺氧。
- C 11. 下列何種方式是依據懷孕婦女子宮底高度位置推估預產期？(A)雙頂徑 (BPD)
(B)內格萊式法則 (Nagel's rule) (C)麥當勞法則 (McDonald's rule) (D)最後一次月經週期 (LMP)。
- B 12. 羊膜穿刺最合宜的時間為妊娠？(A)1~5 週 (B)16~18 週 (C)30~32 週 (D)36~38 週。
- C 13. 高女士，33 歲，孕產史 G2P1，現懷孕 15 週，依醫囑進行母血唐氏症篩檢，其抽血檢驗項目主要為何？(A) β 胎兒蛋白、人類絨毛膜性腺激素 (HCG) (B) α 胎兒蛋白、人類胎盤泌乳激素 (HPL)
(C) α 胎兒蛋白、人類絨毛膜性腺激素 (HCG) (D) β 胎兒蛋白、雌性二醇 (E2)。
- B 14. 有關評估胎動之護理指導，何者正確？
(A)妊娠 20 週的胎動多為因應外在刺激而發生 (B)胎動次數比前一天減少 50%，為胎動警訊
(C)每天建議評估 3 次胎動，30 分鐘內有 1 次胎動即可停止計算
(D)12 小時內胎動少於 3 次，表示胎兒在睡覺。
- B 15. 李太太剛獲知懷孕，由於她長年吃素，在懷孕期間最可能需要補充的是：
(A)維生素 B6 (B)維生素 B12 (C)維生素 K (D)維生素 D。
- C 16. 妊娠期婦女下背痛之護理，何者正確？(A)建議改睡較軟床墊 (B)建議 24 小時使用托腹帶，並盡量扭轉背部
(C)建議操作骨盆搖擺運動 (D)建議多服用高單位鈣片，避免骨質疏鬆。
- D 17. 生產準備課程所介紹的各種減緩解不適的方法，何者錯誤？
(A)給予薦骨重壓或按摩 (B)可坐在生產球上 (C)給予冷、熱敷 (D)抑制情緒、避免喊叫。

- A 18. 有關減輕妊娠心臟疾患心臟負荷量之護理指導，何者正確？
 (A)充足休息及睡眠，盡量採左側臥 (B)配合醫療低蛋白飲食的遵行
 (C)第二妊娠期至少應增加 1kg/週 (D)運動心跳需超過 140 次/分，以增加體能。
- D 19. 有關 RU486 使用敘述，何者正確？(A)為管制藥品第四類 (B)妊娠試驗陽性即可使用
 (C)口服製劑方便婦女在家自行服用 (D)合併使用前列腺素，以利胚胎排出。
- D 20. 有關心臟疾患孕婦之敘述，何者正確？
 (A)心臟疾病分類第四級者能順利通過生產過程 (B)心臟疾病第一級者建議終止妊娠
 (C)心臟疾患孕婦不考率分期，均不建議懷孕 (D)心臟疾患孕婦均應限制妊娠期體重的增加。
- D 21. 妊娠 39 週合併妊娠糖尿病產婦，剖腹產下 4500 公克男嬰，護理人員應特別注意新生兒有無下列何種症狀？(A)體重過重 (B)貧血 (C)高血糖 (D)低血糖。
- B 22. 王女士，懷孕 30 週，陰道突然有無痛性鮮紅色出血，其最有可能是下列何種情況？
 (A)早期破水 (B)前置胎盤 (C)胎盤早期剝離 (D)植入性胎盤。
- D 23. 妊娠早期之孕婦若感染下列何種疾病，容易導致胎兒先天性心臟病、耳聾、白內障等不良後果？
 (A)梅毒 (syphilis) (B)風溼性心臟病 (rheumatic heart disease)
 (C)傷寒 (typhoid fever) (D)德國麻疹 (rubella)。
- B 24. 孕期 TORCH 感染項目，何者錯誤？(A)弓形蟲病 (B)麻疹 (C)單純疱疹病毒 (D)巨細胞病毒。
- D 25. 何種胎產式胎頭徑線最短，較能順利分娩？(A)面產式 (B)額產式 (C)前頂產式 (D)頭頂產式
- B 26. 何為子宮收縮頻率 (frequency) 的定義？(A)宮縮時所持續增加的壓力
 (B)一次宮縮開始到下次宮縮開始之時間(C)宮縮結束之後的平靜期(D)每次宮縮的開始到結束之時間。
- A 27. 王女士，待產期間為右枕前位，進行內回轉時，下列何者正確？(A)自 ROA 旋轉 45 度至 OA
 (B)自 ROA 旋轉 135 度至 OA (C)自 ROP 旋轉 45 度至 OA (D)自 ROP 旋轉 135 度至 OA。
- A 28. 陳女士 G4P3，有急產之經驗，目前子宮頸開 7 公分，主訴便意感，下列敘述何者錯誤？
 (A)請她先上廁所解便，減緩不適 (B)聯絡醫師，並準備生產之環境
 (C)陰道內診了解子宮頸口擴張情形 (D)教導先不要用力，採吹蠟燭式呼吸法。
- B 29. 有關胎心率的監測，下列敘述何者錯誤？(A)正常足月兒的胎心率範圍介於 120~160 bpm
 (B)胎兒受感染時，會導致胎心率過慢 (C)胎心率基準線指監測 10 分鐘以上兩次宮縮間的胎心率
 (D)正常足月兒的胎心率變異性約在 6~10 bpm。
- B 30. 有關產後生殖器官的復舊過程，下列何者正確？(A)每天以相同進展恢復
 (B)子宮體積縮小屬於退行性變化 (C)三種型態的惡露採循環方式排出 (D)大約持續 6 個月。
- B 31. 有關母乳之敘述，下列何者正確？(A)前奶清淡，富含酪蛋白 (B)後奶較白，富含脂肪，熱量較前奶高
 (C)嬰兒吸食前奶才能得到足夠的營養及水分 (D)母乳哺餵時，仍需補充水分給嬰兒。
- B 32. 胎盤娩出後，腦下垂體前葉分泌何者使乳房開始分泌乳汁？(A)催產素(B)泌乳素(C)動情素(D)黃體素。
- D 33. 有關母嬰親善醫院 10 項措施，何者可直接促進親子依附關係？(A)提供產婦母乳支持團體
 (B)除非醫療需求，不提供配方奶 (C)不使用奶瓶奶嘴餵食 (D)生產後於產檯立即性肌膚接觸。
- C 34. 雙胞胎分類中，最易發生雙胞胎輸血症候群 (TTTs) 為下列何者？
 (A)異卵雙胞胎 (B)雙羊膜、雙絨毛膜雙胞胎 (C)雙羊膜、單絨毛膜雙胞胎 (D)連體嬰。
- C 35. 若待產婦有臍帶脫垂情況時，應避免採用哪一種姿勢？
 (A)膝胸臥式 (B)垂頭仰臥式 (C)半坐臥式 (D)下肢抬高之側臥式。
- D 36. 孕婦早期破水的評估與處置，下列何者錯誤？(A)觀察陰道分泌物的顏色及味道
 (B)監測白血球及 C 反應蛋白的變化 (C)盡量減少陰道內診次數，以降低感染機會
 (D)確認懷孕 34~36 週者胎兒的成熟度，如已成熟即可剖腹產。
- B 37. 產後評估深層靜脈血栓，進行伸直腿且足板背側彎曲的試驗稱為：(A)希氏試驗 (Schultze test)
 (B)霍曼氏試驗 (Homan's test) (C)畢夏氏試驗 (Bishop's test) (D)貝拉德試驗 (Ballard test)。
- B 38. 有關毒性休克症候群之敘述，下列何者正確？(A)是受到黴漿菌感染所致
 (B)多發生於經期使用衛生棉條的女性 (C)臨床症狀少有發燒現象 (D)臨床症狀為單一器官系統異常。

- D 39. 林女士外陰部搔癢並有泡沫狀、黃綠色及異味陰道分泌物，內診時子宮頸上皮有草莓狀紅點，最有可能是何種病原感染？(A)砂眼披衣菌 (B)白色念珠菌 (C)梅毒螺旋體 (D)陰道鞭毛滴蟲。
- D 40. 有關子宮頸抹片檢查之敘述，下列何者正確？(A)全民健保提供 35 歲以上婦女 1 年一次免費檢查 (B)不論有無性經驗的婦女，每 3 年至少接受一次子宮頸抹片檢查 (C)檢查前需先沖洗陰道，以避免分泌物過多，影響結果 (D)是目前預防子宮頸癌最好方式。
- D 41. 小美 9 歲，目前就讀國小三年級，下列何者不符合她現階段的認知發展特徵？(A)性別恆定觀 (B)質量守恆概念 (C)可逆性思考 (D)抽象思考能力。
- A 42. 12~15 個月兒童的動作發展，最主要的特徵為何？(A)走路很穩 (B)走上樓梯 (C)會使用湯匙 (D)會疊四塊方形積木。
- D 43. 有關嬰幼兒呼吸系統的敘述，下列何者錯誤？(A)嬰兒喉部與淋巴組織數量較成人多，呼吸道感染時容易有充血、水腫、聲音沙啞等症狀 (B)嬰幼兒的歐氏管(耳咽管)較成人短、寬且直，故易引發中耳炎 (C)嬰幼兒的胸腔小，呼吸肌肉尚未成熟，因而呼吸力量較薄弱，呼吸深度較成人表淺 (D)嬰幼兒會厭軟骨所占的比例比成人小，柔軟且無彈性，易形成呼吸道阻塞。
- C 44. 王小弟為3.5公斤的新生兒，因高膽紅素血症需換血，下列護理措施何者正確？(A)需更換600 c.c.之血量 (B)血液需加溫至37.5°C (C)每換100 c.c.血，需測量及記錄生命徵象 (D)換血需在30分鐘之內完成。
- A 45. 水痘病灶出現的順序為：(A)紅疹→丘疹→水疱→膿疱 (B)水疱→丘疹→膿疱→紅疹 (C)水疱→丘疹→紅疹→膿疱 (D)丘疹→紅疹→水疱→膿疱。
- B 46. 腸病毒重症之主要特徵，何者正確？1.年齡大於3歲 2.肌抽躍(myoclonic jerk) 3.嘔吐 4.腹瀉 5.嗜睡 6.肌肉無力 (A)1+2+3+5 (B)2+3+5+6 (C)2+3+4+5 (D)1+3+5+6。
- C 47. 會通過母體胎盤到達新生兒體內的免疫球蛋白是：(A)IgA (B)IgE (C)IgG (D)IgM
- A 48. 下列何者屬於目前新生兒先天性代謝異常疾病篩檢的項目？(A)半乳糖血症 (B)唐氏症 (C)先天性甲狀腺功能亢進 (D)乳糖不耐症。
- B 49. 有關嬰兒猝死症候群之敘述，下列何者正確？(A)出生體重過重者發生率較高 (B)最常發生在出生 2 至4 個月的嬰兒 (C)女嬰發生率較高 (D)春夏季發生率較高。
- A 50. 王小妹，8 個月大，因連續出現呼吸喘、發燒、聲音沙啞(hoarseness)、如狗吠之咳嗽(barking cough)而到急診，經醫師初步診斷為哮吼(croup)。您判斷最可能的致病原是：(A)病毒 (B)細菌 (C)黴菌 (D)披衣菌。
- B 51. 關於兒童細支氣管炎之敘述，下列何者正確？(A)以細菌感染為多 (B)呼氣時有喘鳴音(wheeze) (C)咳嗽有明顯的鐵銹色的痰 (D)常伴隨有高燒現象。
- B 52. 氣喘兒童使用尖峰呼氣流速計測得的呼氣流量值介於 60~80%估算值時，即表示其呼吸狀態位於何種範圍？(A)綠燈區 (B)黃燈區 (C)紅燈區 (D)藍燈區。
- A 53. 下列哪一個藥可以用來治療開放性動脈導管？(A)indomethacin(indocin) (B)propranolol HCl(nderal) (C)atenolol (tenormin) (D)reserpine (serpasil)
- B 54. 法洛氏四重畸形(TOF)病童發紺缺氧發作(blue spells)時，採膝胸位置(knee-chest position)之理由，不包括：(A)減少下肢靜脈血回流至心臟 (B)減少左心室含氧濃度低的血量 (C)增加肺動脈血流量 (D)增加全身血管的阻力。
- B 55. 小寶每日在9AM 及9PM 時應口服digoxin 藥物，但媽媽在1PM 時才想起今天早上忘記給藥，此時最適當的處理措施為何者？(A)在1PM 時補給一半的藥物劑量 (B)在1PM 時補給一次的藥物劑量 (C)等到9PM 給雙倍藥物劑量 (D)等到9PM 再給一次藥物劑量。
- A 56. 法洛氏四重畸形不包括下列那一項？(A)心房中隔缺損 (B)肺動脈狹窄 (C)右心室肥大 (D)主動脈跨位。
- B 57. 下列屬於左向右分流的先天性心臟病為何？(1)PDA (2)TOF (3)ASD (4)TGA：(A)(1)(2) (B)(1)(3) (C)(3)(4) (D)(2)(4)。

- C 58. 王小弟今年10 歲，請問依據娜姬(Nagy)的理論其對死亡的概念為：(A)會將死亡擬人化(B)死亡是一種短暫的分離(C)死亡是不可回復，不可避免的(D)死亡是不可回復的，但只會發生在老人身上。
- D 59. 林小弟罹患急性淋巴球白血病 (acute lymphoid leukemia ; ALL) 目前正處於化學治療之誘導緩解期 (remission induction) 下列敘述何者錯誤？(A)95%的急性淋巴球白血病患童可以達到緩解情形 (B)通常在給藥30 天後周邊血液及骨髓內的芽細胞會小於5% (C)此時期的患童具有高度的易受感染性及出血傾向 (D)此時期主要目的在於避免復發。
- C 60. 有關急性腎絲球腎炎(acute glomerulonephritis ; AGN)之敘述，下列何者錯誤？(A)主要是受到A 群 β 型溶血性鏈球菌感染所致 (B)高血壓為常見之症狀 (C)應長期給予低鉀、低蛋白飲食 (D)有可能出現血尿及蛋白尿情形。
- B 61. 關成骨不全(osteogenesis imperfecta)之敘述，下列何者錯誤？(A)是一種罕見的先天性胎兒骨骼 發育異常的疾病 (B)應鼓勵病童保持固定的姿態，以避免疼痛 (C)患者骨骼脆弱，易出現骨折的危機(D)典型的病徵是會出現四肢極短、彎曲成弓型及肌肉張力減退
- A 62. 林小弟在出生三天後，經評估出現歐氏徵象 (Ortolani's sign) 其代表的意義為何？(A)是一種發展性髖關節發育不良，當林小弟下肢屈曲外展時，股骨頭滑過髖臼緣所產生的聲音 (B)是一種先天性肌肉萎縮症，林小弟下肢麻痺，無法活動 (C)是一種雙側性足內翻，林小弟的足 部無法往背側屈曲 (D)是一種肌肉炎症，致使受侵犯的肢體骨骼肌肉有攣縮變硬情形。
- A 63. 有關早產兒的臨床表徵，下列敘述何者錯誤？(A)腳掌皺褶明顯 (B)耳廓扁平且易摺疊 (C)腳跟容易觸及耳朵 (D)皮膚光滑可見血管。
- A 64. 造成早產兒腦室內出血(intraventricular hemorrhage)之相關因素，不包括下列何者？(A)出生時，產道壓力使腦部受傷 (B)腦室部位之血流充足，但血管脆弱 (C)腦部之血流不穩定 (D)凝血功能不良
- C 65. 王小弟今年10 歲，請問依據娜姬(Nagy)的理論其對死亡的概念為：(A)會將死亡擬人化 (B)死亡是一種短暫的分離 (C)死亡是不可回復，不可避免的 (D)死亡是不可回復的，但只會發生在老人身上。
- A 66. 有關罹患肛門閉鎖的病童在接受低位性肛門成形術後的護理措施，何者正確？(A)使用烤燈以促進 傷口乾燥及癒合 (B)鼓勵繼續進食正常飲食以降低排便次數 (C)採半坐臥姿以避免因排尿造成 傷口污染 (D)定期測量肛溫以維持肛門之擴張性。
- C 67. 早產兒的免疫系統功能及特徵之敘述下列何者錯誤？(A)妊娠36 週前出生者無法從母體得到IgG(B)早產兒對感染的抵抗能力低，即使感染白血球也不升高 (C)早產兒無法從母體得到IgE，故感染時易發燒 (D)早產兒無法經胎盤得到母體的IgM
- D 68. 幽門狹窄的臨床表徵，下列何者正確？(A)出生後2 到3 個月，才開始出現噴射狀嘔吐 (B)發生率 女嬰為男嬰的5 倍 (C)嚴重的體液電解質不平衡，會出現代謝性酸中毒(D)嘔吐物不含膽汁，上腹部可觸摸到橄欖狀硬塊
- C 69. 高小妹患有心室中隔缺損，合併艾森曼格氏徵候群(Eisenmenger syndrome)，此次因上呼吸道感染而入院治療，下列護理措施何者不適當？(A)儘可能採集中護理 (B)運用遊戲設計靜態活動 (C)靜臥休息，宜採平躺姿勢 (D)衛教家屬，家中需備有氧氣筒。
- A 70. 有關尿道下裂兒童手術的相關護理，下列敘述何者錯誤？(A)向父母解釋，最適合手術的時機是在學齡期 (B)提醒父母及兒童術後需臥床，肢體活動會受限制 (C)運用床上支架，以避免壓迫到手術的部位 (D)安排床邊靜態活動，以轉移兒童活動受限的不適感。
- D 71. 下列何者不是阿帕嘉計分系統(Apgar score system)評分之項目？(A)心跳速率 (B)呼吸狀況 (C)膚色 (D)哭泣聲音。
- A 72. 有關早產兒的臨床表徵，下列敘述何者錯誤？(A)腳掌皺褶明顯 (B)耳廓扁平且易摺疊 (C)腳跟容易觸及耳朵 (D)皮膚光滑可見血管。
- D 73. 有關熱性痙攣(febrile convulsion)的敘述下列何者正確？(A)好發於7 歲以上的兒童 (B)在夏季，兒童體溫會隨著環境溫度升高，而發生抽搐 (C)痙攣發生於發燒24 小時後 (D)痙攣的特性呈現 強直一陣攣性 (tonic-clonic) 抽搐。

- B 74. 5 個月大的小朱罹患水腦症，有關腦室腹膜分流(V-P shunt)手術後的照護，下列敘述何者正確？
(A)術後若出現嘔吐、頭圍增大及食慾差等情形是正常反應
(B)避免將小朱快速抱起，以防顱內的腦脊髓液快速減少
(C)協助小朱躺向接受手術的那一側，以免引流速度過快
(D)引流管阻塞時，引流管周圍會出現皮膚紅腫及疼痛。
- A 75. 下列何者是嬰兒期顱內壓升高的症狀？①頭圍異常增大 ②哭聲尖銳 ③前囟門凹陷 ④血壓下降
⑤落日眼 ⑥脈搏加快。(A) ①②⑤ (B) ①④⑥ (C) ②③⑤ (D) ③④⑥。
- A 76. 有機磷類殺蟲劑中毒時，要用下列何種解毒劑治療？
(A)atropine (B)oxygen (C)deferoxamine mesylate (D)naloxone。
- A 77. 父母或照顧者未能提供兒童基本需求，使兒童無法獲得應有的舒適與健康，此兒童所受之虐待屬於：
(A)疏忽 (B)身體虐待 (C)性虐待 (D)精神虐待。
- C 78. 有關血友病護理之敘述，下列何者錯誤？
(A)避免靜脈注射及任何侵入性治療，減少出血機會
(B)受傷部位必須直接加壓，至少持續10~15 分鐘以上
(C)使用水楊酸藥物或是熱敷來減輕關節疼痛不適
(D)關節出血時，以彈性繃帶維持患肢24~48 小時固定不動。
- B 79. 5 個月大的小朱罹患水腦症，有關腦室腹膜分流(V-P shunt)手術後的照護，下列敘述何者正確？
(A)術後若出現嘔吐、頭圍增大及食慾差等情形是正常反應
(B)避免將小朱快速抱起，以防顱內的腦脊髓液快速減少
(C)協助小朱躺向接受手術的那一側，以免引流速度過快
(D)引流管阻塞時，引流管周圍會出現皮膚紅腫及疼痛。
- C 80. 有關脊柱側彎流行病學的敘述，下列何者正確？
(A)好發於早產兒 (B)好發於學齡前男孩 (C)常見於青春期女孩 (D)男孩發生率高於女孩。